



Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
**КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ**  
**URTICAE FOLIA**

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

**Форма выпуска**

Измельченное сырье

**Общая характеристика**

Кусочки листьев различной формы, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Кусочки листовых пластинок тонкие, ломкие, шершавоволосистые; особенно много волосков по жилкам листа. Кусочки черешков в сечении округлые или полуокруглые с бороздкой на верхней стороне черешка, покрытые волосками. Цвет от зеленого до темно-зеленого с возможным присутствием серо-зеленых, белых, желтовато-белых и коричневых вкраплений. Запах слабый.

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие диуретики.

**Фармакологические свойства**

Лекарственное средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие, повышает тонус матки.

**Показания к применению**

Внутрь: в качестве мочегонного средства в комплексной терапии легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых болей в суставах.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, заболевания почек или тяжелые заболевания сердца). Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Применение лекарственного средства не рекомендовано пациентам с повышенной свертываемостью крови, кровотечениях.

**Способ применения и дозы**

5 г (2 столовые ложки) листьев заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь: по 1/4-1/2 стакана 3-5 раз в день до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Меры предосторожности**

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Если боли в суставах сопровождаются отеком суставов, покраснением кожи или повышением температуры, необходимо обратиться к врачу.

Если во время приема лекарственного средства возникают такие симптомы, как повышение температуры, расстройства мочеиспускания, боли спастического характера или появляется кровь в моче, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

*Применение при беременности и лактации.* В связи с отсутствием данных не рекомендуется применять во время беременности и лактации.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.* Исследования не проводились.

*Применение у детей.* Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

### **Передозировка**

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Условия хранения**

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - не более 2-х суток при температуре (8-15) °С.

### **Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

### **Упаковка**

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

**Производитель:** ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, [www.padiss.by](http://www.padiss.by).

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь