

Листок-вкладыш  
(информация для пациента)

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от « 21 » 09 2018 № 930

Кукурузы столбики с рыльцами  
*Zeae maydis stylis cum stigmatis*

МНН: отсутствует

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Кукурузы столбики с рыльцами содержат флавоноиды, горькие гликозиды, сапонины, эфирное масло, жирное масло, стерины, витамины К и С, соли калия.

**Состав.** Кукурузы столбики с рыльцами измельченные.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

**Показания к применению.** Внутрь: в комплексной терапии некалькулезного холецистита, холангита и дискинезии желчевыводящих путей, в качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, повышенная свертываемость крови, повышенный протромбиновый индекс, анорексия, пониженная масса тела, отеки, вызванные нарушением функции сердца или почек.

**Способ применения и дозы.** 10 г (3 столовые ложки) измельченных столбиков с рыльцами помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1-3 столовые ложки за 15-20 мин до еды 3 раза в день. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие.** Аллергические реакции. При появлении признаков побочных реакций следует прекратить применение отвара и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация отсутствует.

**Передозировка.** Информация отсутствует.

**Меры предосторожности.** При продолжительном применении диуретическое действие может привести к гипокалиемии. В эксперименте лекарственное средство стимулирует сокращение матки у кроликов, поэтому не должно применяться во время беременности. Из-за отсутствия информации о безопасности применения не рекомендуется прием в период лактации и детям до 18 лет.

**Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой.** Информация отсутствует.

**Особенности применения.** Отвар принимают внутрь в теплом виде за 15-20 мин до еды. Длительность лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей течения заболевания, терапевтического эффекта и переносимости препарата. Если во время приема отвара симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар – при температуре от 8°C до 15°C не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 35 г или 50 г в пачке картонной с внутренним

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
БУМАЖНОЙ ПАКЕТНОЙ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Производитель.** ООО «Калина».

**Адрес.** Республика Беларусь,  
211019 Витебская обл.,  
Оршанский р-н, д. Пищалово.  
Тел: (0216) 54-81-68.