

Листок-вкладыш – информация для пациента

Метилурацил, 100 мг/г, мазь для наружного применения

Действующее вещество: метилурацил

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что собой представляет препарат Метилурацил и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Метилурацил.
3. Применение препарата Метилурацил.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Метилурацил.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МЕТИЛУРАЦИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Мазь Метилурацил содержит в своём составе метилурацил, который ускоряет процессы клеточного восстановления, заживление ран, стимулирует клеточные и тканевые факторы защиты, а также оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению

Препарат Метилурацил применяется для комплексного лечения следующих состояний:

- дерматиты;
- плохо заживающие раны;
- ожоги;
- эрозии и язвы кожи (в том числе после лучевой терапии);
- трещины кожи заднего прохода и молочных желез.

Применяется также в качестве фотозащитного средства при фотодерматитах.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТИЛУРАЦИЛ

Не применяйте препарат Метилурацил:



- если известно о наличии у Вас аллергии на метилурацил или на любые другие компоненты этого лекарственного препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас плохо заживающая инфицированная рана;
- если у Вас имеются заболевания кровеносной системы, включая злокачественные.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом до начала применения препарата Метилурацил, если у Вас наблюдаются перечисленные ниже состояния (симптомы), возможно, Ваш лечащий врач примет ряд необходимых мер (например, назначит Вам дополнительное лечение или будет контролировать Ваше состояние более часто).

С осторожностью применяйте при кожных заболеваниях, сопровождающихся наличием образований на поверхности кожи.

С осторожностью применяйте при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических заболеваний.

Не применяйте на больших участках кожи – при нарушениях обмена холестерина и тяжёлых заболеваниях печени.

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему лечащему врачу.

Другие препараты и препарат Метилурацил

Сообщите своему лечащему врачу, если Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Мазь Метилурацил можно применять с другими антисептическими и антибактериальными препаратами. Одновременное местное применение глюкокортикоидов (гидрокортизон, преднизолон, бетаметазон, триамцинолон и другие) ослабляет эффект мази.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение возможно только в том случае, когда ожидаемая польза от применения для матери превышает потенциальный риск для плода.

Перед тем как применять любой лекарственный препарат, проконсультируйтесь с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕТИЛУРАЦИЛ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Мазь наносят тонким слоем на поражённые участки кожи 2 раза в день.

При эрозиях, язвах и ранах мазь наносят после предварительной обработки антисептиками. Длительность лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Путь и способ введения

Наружно.

Если Вы применили препарата Метилурацил больше, чем следовало

Если Вы по ошибке применили больше лекарственного препарата, чем было рекомендовано, то Вам следует незамедлительно связаться с Вашим лечащим врачом. Врач примет решение о необходимости принятия адекватных мер.

При длительном применении в больших дозах возможны изменения состава периферической крови.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Метилурацил может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех:

- кратковременное легкое жжение, аллергические реакции (сыпь, зуд, раздражение, покраснение на месте применения, высыпания).

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о любых нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Тел/факс: + 375 (17) 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕТИЛУРАЦИЛ

Храните лекарственный препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог его увидеть.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке (картонной пачке). Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Данные меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Метилурацил содержит

Действующее вещество: метилурацил.

Одна туба (15 г мази) содержит 1,5 г метилурацила.

Прочие ингредиенты (вспомогательные вещества): парафин мягкий белый, ланолин, вода очищенная.

Внешний вид препарата Метилурацил и содержимое упаковки

Мазь желтоватого цвета, с характерным запахом.

15 г в тубе алюминиевой. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

тел/факс: + 375 (177) 73-56-12, + 375 (177) 73-11-56

Эл. почта: market@borimed.com

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Данный листок-вкладыш пересмотрен:

19.10.2022

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза.