


Инструкция  
по применению препарата  
**Постеризан форте (Posterisan® forte)**

**Регистрационное удостоверение №**

**Состав**



Действующие вещества: 1 г мази содержит: 166,70 мг стандартизированной суспензии клеток бактерий *E. Coli*, что соответствует  $500 \times 10^6$  *E. Coli*, инактивированных и законсервированных с 3,30 мг жидкого фенола (соотв. 3,0 мг чистого фенола), 2,50 мг гидрокортизона.

Вспомогательные вещества: ланолин, парафин желтый мягкий.

**Лекарственная форма.** Мазь ректальная.

Основные физико-химические свойства: однородная мазь, от желтоватого до слегка бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

**Фармакотерапевтическая группа.**

**СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.**

**Средства, содержащие кортикостероиды.**

Код АТС C05AA.

**Фармакологические свойства.**

Фармакодинамика.

Компоненты клеточной стенки бактерий, содержащиеся в стандартизированной бактериальной культуре *E.coli*, стимулируют процессы местного иммунитета, ускоряя процессы заживления повреждений.

Гидрокортизон ингибирует реакции воспаления, аллергии, уменьшает локальную болезненность и зуд.

Фармакокинетика.



По данным иммуногистохимических доклинических исследований, компоненты бактериальной стенки E.coli способны проникать в слизистую оболочку кишечника.

При местном нанесении гидрокортизон проникает во все слои слизистой оболочки, незначительное количество попадает в регионарный и системный кровоток. Применение гидрокортизона в составе мази ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ не приводит к значимому повышению концентрации гидрокортизона в системном кровотоке. При непродолжительном применении лекарственного средства в указанной дозировке ожидается отсутствие проявлений системного действия гидрокортизона.

#### **Показания к применению.**

Местное лечение симптомов геморроя (зуд, боль, отек) и трещин анальной области.

#### **Способ применения и дозы.**

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анальной области.

Взрослым наносить мазь на пораженный участок кожи и слизистые оболочки 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации, осторожно втереть пальцем.

Для введения мази в анальный канал и прямую кишку можно использовать аппликатор с боковыми отверстиями, который находится в ураковке.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Обычно срок применения составляет 5-7 дней.

*Дети.*

Не применять детям.

### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из компонентов препарата.

Специфические инфекции в аноректальной области (туберкулез, сифилис, гонорея), ветряная оспа, реакция на вакцинацию, грибковые заболевания, воспалительные заболевания кожи лица (периоральный дерматит, розацеа), другие бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции, язвенные поражения и атрофические изменения в области применения лекарственного средства, опухоли аноректальной зоны.

### **Меры предосторожности.**

Лечение продолжать до исчезновения симптомов, но не более 5-7 дней.

При отсутствии эффекта необходимо пересмотреть проводимую терапию.

При применении любых глюкокортикостероидов следует помнить о возможности системной абсорбции.

В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местный противогрибковый препарат.

Во время лечения мазью Постеризан форте прочность презервативов на разрыв может уменьшиться из-за содержания компонента желтого мягкого парафина, и, таким образом, это может негативно повлиять на качество презерватива.

Содержит ланолин. Может вызвать местные реакции кожи (например, контактный дерматит).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

При одновременном применении мази Постеризан форте с другими препаратами, содержащими кортикостероиды (в форме таблеток, капель или инъекций), возможно усиление терапевтических и побочных эффектов глюкокортикостероидов.



## **БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**

### **Беременность**

Отсутствуют соответствующие данные по применению медицинских препаратов беременными женщинами.

Таким образом, медицинские препараты необходимо применять во время беременности исключительно в тех случаях, когда это строго показано и после тщательной оценки соотношения польза-риск.

### **Лактация**

Гидрокортизон выделяется в грудное молоко. В течение продолжительного периода и периода приема гидрокортизона или введения больших доз указанного вещества необходимо избегать кормления ребенка грудью.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.**

Данные отсутствуют.

### **Побочные реакции.**

В отдельных случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам мази Постеризан форте могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение, депигментация, гипертрихоз, сухость кожи.

Может вызвать контактный дерматит (реакции, вызываемые фенолом и ланолином).

При длительном использовании препарата в высоких дозах возможны следующие дерматологические реакции: дерматит, экзема, замедление заживления ран и трещин, развитие вторичной инфекции, атрофия слизистой оболочки, атрофия кожи, аденокортикальная супрессия, расширение капилляров (телеангиэктазия), появление растяжек на коже (стрий) и стероидных угрей.



**Передозировка**

О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось. Передозировка вызывает угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В случае случайного приема внутрь мази (например, детьми) возможны проявления дисфункции желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

Длительное применение в больших дозах усиливает резорбцию и повышает риск развития системных эффектов гидрокортизона, таких как нарушения менструального цикла, повышение артериального давления, замедление заживления ран, мышечная слабость, бессонница, повышение уровня сахара в крови.

В случае, если наблюдаются симптомы гиперкортицизма, лечение следует прекратить.

**Форма выпуска**

25 г в тубе алюминиевой, внутри дважды лакированной, закрывающейся колпачком из полиэтилена, в пачке картонной с аппликатором и инструкцией по применению.

**Условия хранения**

В защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

**Срок годности**

3 года

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.



НД РБ

6310 - 2019

**Производитель**

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200



Содержит информацию о товаре, который  
является объектом интеллектуальной собственности  
и/или товарного знака. Любое использование  
этой информации без разрешения правообладателя  
является нарушением законодательства  
и/или может повлечь за собой ответственность  
в соответствии с действующим законодательством.