

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Ацилакт, суппозитории вагинальные**



**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Ацилакт

**Международное непатентованное название:** лактобактерии ацидофильные&

**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные

Препарат представляет собой биомассу лактобактерий ацидофильных содержащую живые лактобактерии ацидофильные штаммов *Lactobacillus acidophilus* 100аш, NK<sub>1</sub>, K<sub>3</sub>Ш<sub>24</sub>, лиофилизированную в среде культивирования с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды, сформированную в медицинские суппозитории. Один суппозиторий (1 доза) содержит биомассу лактобактерий ацидофильных, содержащую живые лактобактерии ацидофильные - не менее 10<sup>7</sup> КОЕ; вспомогательные вещества – жир кондитерский – 0,9 г, парафин твердый – 0,1 г, эмульгатор Т2 – 0,1 г.

Суппозитории конусообразной или цилиндрической формы, желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, допускается неоднородность цвета в виде вкраплений или «мраморности», возможно окрашивание кончика суппозитория от бледно-желтого до светло-коричневого цвета, имеют специфический запах кондитерского жира.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и противомикробные средства для лечения в гинекологии. Прочие антисептические и противомикробные средства.

**Код АТХ:** G01AX14

**Биологические свойства:** Ацилакт обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая стафилококки, энтеропатогенные кишечные палочки, протей, что определяет корректирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза женских гениталий.

**Назначение:** для нормализации влагалищного микробиоценоза в комплексной терапии неспецифических воспалительных процессов влагалища.

**Показания к применению:**

- для нормализации влагалищного микробиоценоза в составе комплексной или в качестве монотерапии при лечении неспецифических бактериальных кольпитов, включая гарднереллез, в том числе у беременных женщин.

- подострая и хроническая стадии воспалительных процессов женской половой сферы.

Назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации;

- гормонально-зависимые кольпиты, сенильные и др. Назначают как самостоятельное средство и в комплексе с гормонотерапией;
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании и после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии при лечении инфекций, передающихся половым путем (ИППП): гонорея, урогенитальный хламидиоз, генитальный герпес. Назначают после антибактериальной терапии с целью нормализации влагалищного микробиоценоза.

Рекомендуется сочетанное применение суппозиториев и одной из пероральных форм ацилакта.

**Противопоказания:** не установлены.

Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

**Способ применения и дозы:** перед интравагинальным введением с суппозитория удаляют упаковочный материал.

При лечении гормонозависимых кольпитов, включая сенильные, а также не специфических бактериальных кольпитов, препарат применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

У беременных женщин при нарушении чистоты вагинального секрета III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

С целью восстановительной терапии после применения антибиотиков применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс ~~повторяют по назначению врача~~ через 10-20 дней.

**Побочные действия:** не выявлены

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** применение Ацилакт суппозиториев возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Не рекомендуется одновременное вагинальное применение антибактериальных препаратов с Ацилакт суппозиториями.

**Применение во время беременности и лактации:** лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Применение в педиатрической практике:** не изучалось

**Особые указания:** препарат не влияет на выполнение видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

**Форма выпуска:** по 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной белого цвета.

По 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона с инструкцией по применению.

**Условия отпуска из аптек:** отпускается без рецепта

**Срок годности препарата.** 2 года

**Условия хранения:** при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия транспортирования:** при температуре от 2 до 8 °С.

**Препарат не пригоден для применения:**

- с истекшим сроком годности;
- без маркировки;
- целостность упаковки которого нарушена;
- с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появление запаха прогорклого жира, деформация суппозитория).

**Производитель/адрес места производства:**

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», Россия

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38;

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38, стр. 3.

**Владелец регистрационного удостоверения/организация принимающая претензии потребителя**

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», Россия, 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, д. 17, корп. 12, комн. 25г, тел.: (499) 257-10-90.

