



**ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**  
**Бензилбензоат**

*Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

**Международное непатентованное название:** Benzyl benzoate.

**Форма выпуска:** мазь для наружного применения.

**Описание лекарственной формы:** Мазь белого или желтовато-белого цвета со специфическим запахом.

**Состав лекарственного средства:** 1 г мази содержит в качестве действующего вещества соответственно 100 мг и 200 мг бензилбензоата.

**Вспомогательные вещества:** парафин мягкий белый, макрогол 400, макроголглицерина гидроксистеарат, макрогола цетостеариловый эфир, цетостеариловый спирт, стеариновая кислота, диэтаноламин, лимонная кислота моногидрат, хлоргексидина диглюконата раствор, вода очищенная.

**Фармакотерапевтическая группа:** Средство для уничтожения эктопаразитов, включая средство против чесоточного клеща

**Показания к применению**  
- чесотка

**Способ применения и дозировка**

Для взрослых применяется мазь бензилбензоата 200 мг/г, для детей – 100 мг/г.

Перед началом лечения пациенту целесообразно принять горячий душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также разрыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения лекарственного средства).

При чесотке мазь наносят на весь кожный покров, исключая лицо и волосистую часть головы. Курс лечения продолжается 4 дня. В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом.

Мазь втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистую одежду и постельное белье. На 2-й и 3-й дни делают перерыв в лечении, при этом остатки мази не смывают с кожи. На 4-й день вечером пациент моется с мылом и проводит втирание мази, как в первый день, используя оставшуюся мазь, и еще раз меняют все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов; в последующем руки обрабатывают мазью после каждого мытья. В случае смывания мази с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на пятый день лечения.

Сохранение зуда в течение нескольких дней после полноценного курса лечения не является показателем его неэффективности.

### **Передозировка**

При использовании мази по назначению случаи передозировки не известны. При случайном проглатывании или использовании очень большого количества мази возможно: усиление побочных эффектов, появление признаков возбуждения центральной нервной системы (судороги) и задержка мочи.

Лечение симптоматическое. С кожи мазь следует смыть, при приеме внутрь необходимо промыть желудок и принять активированный уголь. При необходимости использовать противосудорожные лекарственные средства.

### **Побочное действие**

Бензилбензоат может вызвать контактный дерматит, аллергические кожные реакции, такие как раздражение кожи и жжение, ощущение боли. Эти побочные эффекты могут быть более выраженными у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам мази, а также если на коже имеются царапины или при попадании мази на слизистую оболочку половых органов. Если эффект является серьезным, необходимо смыть мазь с мылом и водой. Лечение отменять не следует.

Чрезмерное применение бензилбензоата может быть причиной затруднения мочеиспускания, судорог или конвульсий у детей. При развитии любой из побочных реакций необходимо смыть мазь и немедленно обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;
- беременность, лактация;
- детский возраст до 3-х лет (для мази бензилбензоата 100 мг/г )
- детский возраст до 18 лет (для мази бензилбензоата 200 мг/г)


### **Меры предосторожности**

Следует избегать попадания лекарственного средства в глаза. На участки с нежной кожей мазь наносится без интенсивного втирания.

Следует проводить смену белья и постельных принадлежностей.

Обработка пациентов в одном очаге, а также контактных лиц, должна проводиться одновременно. Пиодермиты, экземы (осложнения) следует лечить одновременно с чесоткой и продолжать после ее ликвидации. Все белье и то, что соприкасалось с пораженной кожей (включая, например, манжеты тонометра и т.п.), должно подвергаться тщательной обработке. Для этого постельное и нижнее белье, полотенца и верхнюю одежду следует стирать при температуре, по меньшей мере, 60<sup>0</sup>С. Верхнюю одежду можно также прогладить с обеих сторон горячим утюгом. Если предметы или одежду можно стирать только при более низких температурах или вообще нельзя подвергать стирке, следует положить их на 7 дней в закрытые полиэтиленовые пакеты или вывесить на открытый воздух на 3 дня. Ковры, матрасы и мягкую мебель следует тщательно пропылесосить, обработать средствами для дезинфекции или подвергнуть камерной дезинфекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств. Рекомендуются во время лечения избегать интенсивного воздействия солнечного света. При случайном попадании лекарственного средства:

- в полость рта – полость рта прополоскать обильно водой или 2% теплым раствором гидрокарбоната натрия (“питьевой соды”);
- в нос – обильно промыть водой;
- в глаза – тщательно промыть водой или 1% раствором гидрокарбоната, при раздражении слизистой оболочки глаз закапывать 30% раствором альбумида натрия. В случае проглатывания и попадания лекарственного средства в желудок, а также появления каких-либо нежелательных реакций следует немедленно обратиться к врачу.



После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время.

Применение у лиц с нарушением функции печени и почек не изучено.

Лекарственное средство содержит в составе цетостеариловый спирт, в связи с чем может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

*Применение у детей.* Не рекомендуется использование у детей до 3-х лет (для мази бензилбензоата 100 мг/г) и до 18 лет (для мази бензилбензоата 200 мг/г).

#### **Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Фармакологического взаимодействия мази Бензилбензоат с другими лекарственными средствами не выявлено, однако, как и все противопаразитарные средства ее не рекомендуется применять одновременно с другими наружными лекарственными средствами.

#### **Беременность и лактация**

Не рекомендуется применять беременным и в период кормления грудью.

#### **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами**

Не влияет.

#### **Упаковка**

По 15,0 г, 30,0 г, 50,0 г в тубах, помещенных вместе с листком-вкладышем для потребителя в пачки из картона.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года. Срок годности указан на упаковке.

Данное лекарственное средство нельзя использовать после даты, указанной на упаковке.

#### **Условия отпуска из аптек**

Отпускается без рецепта врача.

**Производитель:** ООО «Фармтехнология», 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22,  
тел./факс: (017) 309 44 88, e-mail: ft@ft.by; www.ft.by.

