

8 4 3 0 - 2 0 1 6

СОГЛАСОВАНО
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь
Регистрационное удостоверение
№

БЕПАНТЕН®
Листок-вкладыш
(для пациентов)

Торговое название

Бепантен

Международное непатентованное название

Декспантенол

Лекарственная форма

Крем для наружного применения

Описание

Гомогенный непрозрачный крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения ран и язв. Ранозаживляющие средства. D03AX03

Состав

1 г крема содержит

действующее вещество: декспантенол 50 мг;

вспомогательные вещества: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К, цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин (E913), изопропилмиристат, пропиленгликоль (E1520), очищенная вода.

Фармакологические свойства

Декспантенол представляет собой спиртовой аналог пантотеновой кислоты и имеет такую же биологическую активность. Декспантенол быстро проникает в клетки и превращается в пантотеновую кислоту, которая оказывает тот же эффект, что и витамин B₅.

Пантотеновая кислота и ее соли представляют собой водорастворимые витамины, входят в состав ацетилкоэнзима А и играют важнейшую роль в многочисленных обменных процессах.

Таким образом, декспантенол может удовлетворить повышенную потребность организма в пантотеновой кислоте, которая необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек. Большей частью выводится из организма с мочой и калом в неизменном виде.

Показания к применению

Лечение сухой и раздраженной неповрежденной кожи: гиперемия, легкие ожоги (солнечные и бытовые), обработка шероховатых участков кожи (например, на кистях рук, локтях, коленях и т.п.).


Профилактическая обработка сухой, покрасневшей кожи.

Ускорение заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (трещины, царапины), при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения.


Обработка кожи после применения кортикостероидов.

Способ применения и дозы

Наносить крем тонким слоем несколько раз в день на пораженные участки кожи. Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания.



КАС № 10 от 08.11.2016

**Побочные действия**

Перечисленные ниже побочные эффекты основаны на спонтанных сообщениях. Точную частоту встречаемости каждого из них не представляется возможным.

Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, в том числе кожные – контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

Декспантенол хорошо переносится даже в высоких дозах и считается нетоксичным.

Меры предосторожности

Ланолин, стеариловый спирт и цетиловый спирт, пропиленгликоль могут вызвать раздражение кожи (например, контактный дерматит).

Следует избегать попадания крема в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Беременность и лактация

Нет никаких ограничений по использованию крема в период беременности и кормления грудью.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

Туба 30 г или 100 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

ГП Гренцах Продукционс ГмбХ,
Эмиль-Барелл-Штрассе 7, D-79639 Гренцах-Вилен, Германия