

## Листок-вкладыш: информация для потребителя

### Глицерин, 1,24 г, суппозитории ректальные

Действующее вещество: глицерин (глицерол)

**Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

#### **Содержание данного листка:**

1. Что из себя представляет препарат Глицерин суппозитории ректальные, и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед применением препарата Глицерин суппозитории ректальные
3. Применение препарата Глицерин суппозитории ректальные
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Глицерин суппозитории ректальные
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

#### **1. Что из себя представляет препарат Глицерин суппозитории ректальные, и для чего его применяют**

Глицерин - слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника. Практически не всасывается при ректальном применении.

#### **Показания к применению**

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

#### **2. О чём следует знать перед применением препарата Глицерин суппозитории ректальные**

**Не применяйте препарат Глицерин суппозитории ректальные, если у Вас:**

- аллергия (повышенная чувствительность) на компоненты препарата (перечислены в разделе 6),
- кишечная непроходимость,
- синдром раздражённого кишечника,
- аппендицит,
- желудочно-кишечное кровотечение,
- воспалительные заболевания прямой кишки (проктит, парапроктит),
- геморрой (фаза обострения),
- геморрагический ректоколит,
- опухоли прямой кишки,

- недиагностированная боль в животе.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Глицерин суппозитории ректальные обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Не рекомендуется применять суппозитории более 7 дней.

Систематическое применение не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твёрдыми маслами.

При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

До и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

#### *Применение у детей*

Применение препарата у детей младше 3 лет возможно только после консультации врача и исключения заболеваний, которые могли повлиять на задержку опорожнения кишечника.

Применение лекарственного средства у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

### **Другие препараты и препарат Глицерин суппозитории ректальные**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Клинически значимые взаимодействия глицерола с другими лекарственными средствами не выявлены.

При одновременном применении других ректально вводимых лекарственных средств следует учитывать слабительный эффект препарата.

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые применяются ректально.

При необходимости использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только после консультации врача в случае, если польза для матери превышает возможный риск для плода/ребёнка.

Применение лекарственного средства в течение первого триместра беременности не рекомендовано.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Данных о влиянии на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами нет.

### **3. Применение препарата Глицерин суппозитории ректальные**

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### *Путь и способ введения:*

Ректально.

#### *Рекомендуемая доза:*

Детям с 3 до 7 лет – по 1 суппозиторию (1,24 г) 1 раз в сутки.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

При необходимости применения у взрослых и детей старше 7 лет - по 2 суппозитория (1,24 г) 1 раз в сутки.

Продолжительность применения не должна превышать 7 дней.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.

**Если Вы применили препарата Глицерин суппозитории ректальные больше, чем следовало.**

О случаях передозировки при применении препарата Глицерин суппозитории ректальные не сообщалось. При правильном применении передозировка маловероятна.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении данного препарата возможны следующие нежелательные реакции:

неизвестная частота (частота не может быть оценена по имеющимся данным):

- аллергические реакции,
- местные реакции в месте введения суппозитория (чувство дискомфорта, зуд, жжение),
- спазмы кишечника,
- ослабление физиологического процесса дефекации (при длительном применении).

У пациентов с обезвоживанием после применения глицерина в виде суппозиториев возможно развитие тяжёлой дегидратации, приводящей к сердечно-сосудистой недостаточности и отёку лёгких. Описаны случаи развития некетотической гиперосмолярной гипергликемической комы, которая может привести к летальному исходу.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а,

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <http://www.rceth.by>

#### **5. Хранение препарата Глицерин суппозитории ректальные**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
---

**Препарат Глицерин суппозитории ректальные содержит**

Действующим веществом является глицерин (глицерол).

Каждый суппозиторий содержит 1,24 г глицерина (глицерола).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат.

**Внешний вид препарата Глицерин суппозитории ректальные и содержимое упаковки**

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий-полизтилен. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта врача.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

**Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:****Претензии потребителей направлять по адресу:**

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)

**СОГЛАСОВАНО**  
 министерством здравоохранения  
 Республики Беларусь  
 Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

**Листок-вкладыш пересмотрен**

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на сайте Союза:  
<http://www.eurasiancommission.org>