

## Листок-вкладыш – информация для пациента

**Гепарин Плюс, (100 МЕ + 40 мг + 0,8 мг)/г,  
мазь для наружного применения**

Действующие вещества: гепарин (в виде гепарина натрия),  
бензокаин, бензилникотинат

**Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Гепарин Плюс, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Гепарин Плюс.
3. Применение препарата Гепарин Плюс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гепарин Плюс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Гепарин Плюс, и для чего его применяют**

19.85.5-2019

Лекарственный препарат Гепарин Плюс относится к группе препаратов, применяемых при варикозном расширении вен.

Препарат применяется у взрослых при:

- тромбофлебите поверхностных вен;
- поверхностном перифлебите;
- подкожной гематоме;
- постинъекционном и постинфузионном флебите;
- отеке и кровоподтеке в результате травм и ушибов мягких тканей (не раньше, чем через сутки после травмы);
- наружном геморрое.

## **2. О чём следует знать перед применением препарата Гепарин Плюс**

Не принимайте препарат Гепарин Плюс, если у Вас:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- в настоящий момент или в анамнезе гепарин-индуцированная тромбоцитопения II типа, гипокоагуляция;
- кровотечение в месте предполагаемого нанесения мази, нарушение целостности кожных покровов пораженной области (открытые инфицированные раны, язвенно-некротические процессы в особенности);
- детский возраст до 18 лет.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Гепарин Плюс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не следует наносить на открытые раны, при наличии гнойных процессов. Применение мази не рекомендуется при глубоком венозном тромбозе.

При применении местных форм гепарина (в том числе мази) не исключен риск развития гепарин-индуцированной иммунной тромбоцитопении II типа со снижением количества тромбоцитов  $<100 \times 10^9/\text{л}$  или  $<50\%$  от исходного уровня с развитием артериального или венозного тромбоза. Для профилактики данного осложнения необходимо контролировать уровень

тромбоцитов у пациентов с эпизодами тромбоза в анамнезе. Максимальный риск развития данного осложнения наблюдается на 6-14 день после начала лечения. В связи с возможностью системного действия, использовать лекарственный препарат Гепарин Плюс, мазь следует с осторожностью. У пациентов с повышенной чувствительностью к гепарину тромбоцитопения может развиться в течение нескольких часов.

Пациентам, имеющим в анамнезе тромбоэмбolicкие осложнения, следует назначать гепариновую мазь с осторожностью, в связи с возможностью системного действия мази. С целью дифференциальной диагностики гепарин-индукции тромбоцитопении II типа рекомендуется определять количество тромбоцитов в крови.

При отсутствии эффекта от проводимой терапии или ухудшении состояния рекомендуется обратиться к врачу.

#### **Дети и подростки**

Не применять у детей.

#### **Другие препараты и препарат Гепарин Плюс**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Мазь не назначают одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), тетрациклинами, блокаторами H1-гистаминовых рецепторов.

При одновременном назначении антикоагулянтов и дезагрегантов (например, варфарина, ацетилсалicyловой кислоты, дипиридамола, стрептокиназы) возможно усиление противосвертывающего эффекта гепарина.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Безопасность применения препарата при беременности и в период лактации не установлена. Гепарин не проходит через плацентарный барьер и не выделяется с грудным молоком. Сведений о попадании других компонентов препарата в грудное молоко нет. Лекарственный препарат Гепарин Плюс, мазь применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Лекарственный препарат не оказывает неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **3. Применение препарата Гепарин Плюс**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на область поражения (из расчета 0,5-1 г на участок диаметром 3-5 см) и осторожно втирают в кожу 2-3 раза в день ежедневно до исчезновения воспалительных явлений, в среднем от 3 до 7 дней. Возможность проведения более длительного курса лечения определяется врачом.

При тромбозе наружных геморроидальных узлов применяют ректальные тампоны, мазь наносят на бязевую или полотняную прокладку, которую накладывают непосредственно на тромбированные узлы и фиксируют. Мазь следует применять ежедневно, до исчезновения симптомов, в среднем, от 3 до 10 дней. С этой же целью можно использовать тампон, пропитанный мазью, который вводят в задний проход.

Применение у детей: препарат противопоказан детям до 18 лет.

**Если Вы применили препарата Гепарин Плюс больше, чем следовало**

В связи с незначительной системной абсорбцией передозировка маловероятна. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Гепарин Плюс может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех:

- гиперемия кожи, аллергические реакции;
- метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат могут вызвать аллергические реакции замедленного типа. Бензилникотинат может вызывать чувство жжения.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием лекарственного препарата обратиться к врачу.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **5. Хранение препарата Гепарин Плюс**

Храните лекарственный препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог его увидеть.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

#### Срок годности

1985 Б - 2019



Не принимайте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

1 грамм мази содержит действующие вещества: гепарин (в виде гепарина натрия) - 100 МЕ; бензокайн - 40 мг; бензилникотинат - 0,8 мг;

вспомогательные вещества: глицерин, парафин мягкий белый, стеариновая кислота, кукурузное масло рафинированное, эмульгатор № 1, метилпрагидроксибензоат Е218, пропилпрагидроксибензоат Е216, вода очищенная.

#### **Внешний вид препарата Гепарин Плюс и содержимое упаковки**

Мазь однородной консистенции белого с желтоватым оттенком цвета.

#### **Упаковка**

По 25 г в тубах алюминиевых с колпачками из полимерного материала. Каждая туба вместе с листком-вкладышем помещается в пачку из картона.

#### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

НД РБ

1985 Б - 2019

Данный листок-вкладыш пересмотрен

СОГЛАСОВАНО  
министерством здравоохранения  
Республики Беларусь  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Подробные сведения о лекарственном препарате Гепарин Плюс содержатся в ОХЛП и доступны на официальном сайте уполномоченного органа государства – члена Евразийского союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: [www.rceth.by](http://www.rceth.by).