

Витапрост®, 20 мг, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Действующее вещество: простаты экстракт

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 10 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка:

1. Что из себя представляет препарат Витапрост® таблетки, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Витапрост® таблетки
3. Прием препарата Витапрост® таблетки
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Витапрост® таблетки
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Витапрост® таблетки, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Витапрост® является простаты экстракт, действие которого направлено на предстательную железу. Препарат уменьшает степень отека, нормализует параметры эякулята и эякуляцию, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе, препятствует развитию тромбоза в простате. Витапрост® умеренно уменьшает объем предстательной железы. Препарат уменьшает выраженность симптомов нарушения оттока мочи и симптомов раздражения мочевого пузыря при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, что выражается в увеличении скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи. Уменьшает боль и дискомфорт, вызванные простатитом, устраняет дизурические явления. Кроме того, Витапрост® восстанавливает работу клеток простаты.

Показания к применению

В комплексной терапии хронического абактериального простатита.
Профилактика обострений хронического абактериального простатита.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Витапрост® таблетки

Не принимайте препарат Витапрост® таблетки:

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на простаты экстракт или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Витапрост® таблетки обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Препарат Витапрост® таблетки применяют только для лечения взрослых мужчин. Не применяют у женщин и детей.

Лечение хронического простатита и состояний до и после оперативных вмешательств на предстательной железе должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением таблеток Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

Другие лекарственные препараты и препарат Витапрост® таблетки

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат не применяется у женщин.



Препарат Витапрост® таблетки содержит сахарозу и лактозы моногидрат

Если Ваш врач сказал Вам, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат.

Если у Вас редко встречающаяся наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция, Вам не следует принимать этот препарат.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

3. Применение препарата Витапрост® таблетки

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в день.

Длительность курса лечения препаратом Витапрост® при доброкачественной гиперплазии предстательной железы – не менее 30 дней, при хроническом простатите – не менее 10 дней.

Для профилактики обострений хронического простатита применяют по 1 таблетке 2 раза в день в течение не менее 30 дней – 1-2 раза в год.

Если вы приняли препарата Витапрост® таблетки больше, чем следовало.

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

7514 - 2020

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении данного препарата возможны следующие нежелательные реакции:

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000) – аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <http://www.rceth.by>



5. Хранение препарата Витапрост® таблетки

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Витапрост® таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, содержит

Действующим веществом является простаты экстракт.

Каждая таблетка содержит: водорастворимые пептиды – 20 мг (в виде простаты экстракта – 100 мг).

Вспомогательными веществами являются: сахароза (28,5 мг), лактозы моногидрат (7,125 мг), кальция стеарат, кросповидон, целлюлоза микрокристаллическая; *состав оболочки*: акрил-из (метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, индигокармин).

Внешний вид препарата Витапрост® таблетки и содержимое упаковки

Таблетки от голубого до светло-синего цвета, круглые, двояковыпуклые, допускается наличие вкраплений.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

Две контурные ячейковые упаковки вместе с листком – вкладышем помещают в пачку картонную.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Нижфарм», Россия
ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

**Все претензии потребителей направлять представителю держателя
регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:**

АО «Нижфарм», Россия
ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105
Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

