

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
КЛИМАЛАНИН

Торговое название: КЛИМАЛАНИН

Международное непатентованное название: —

Лекарственная форма: таблетки.

Состав на 1 таблетку

Действующее вещество:

Бета-аланин 400,0 мг.

Вспомогательные вещества:

Магния стеарат (E470), глицерина пальмитил стеарат, кремния диоксид коллоидный гидратированный, крахмал пшеничный.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого цвета с блестящими сероватыми краплениями. Допустима незначительная шероховатость поверхности.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для применения в гинекологии.

Код АТХ:G02CX

Фармакологические свойства

Бета-аланин – аминокислота, которая оказывает воздействие на кожную периферическую вазодилатацию, являясь негормональным ингибитором приливов в период менопаузы.

Показания к применению

«Приливы» в период менопаузы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Повышенная чувствительность или непереносимость глютена (в связи с наличием в составе препарата пшеничного крахмала).

Способ применения и дозировка

Препарат принимают внутрь по 1-2 таблетки ежедневно. При необходимости доза может быть увеличена до 3 таблеток в сутки. Длительность лечения составляет от 5-10 дней до исчезновения "приливов".

При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения.

Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

Меры предосторожности

В случае наличия почечной или печеночной недостаточности рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом. Следует с осторожностью применять данное лекарственное средство.



**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

Препарат Клималанин предназначен для использования у женщин в период менопаузы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Побочное действие

Редко: проходящие парестезии, как правило, в верхних и нижних конечностях.

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь).

Упаковка

15 таблеток в блистере из ПВХ/алюминия. По 2 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ, Франция