



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### Антиоксикапс

**Торговое название:** Антиоксикапс.

**Форма выпуска:** капсулы.

**Состав:** одна капсула содержит: бета-каротина в виде 30% суспензии в масле – 6 мг, альфа-токоферилацетата – 15 мг, кислоты аскорбиновой – 75 мг.

**Вспомогательные вещества** – воск пчелиный, лецитин (Солек В-10), подсолнечное масло.

**Состав оболочки капсулы:** желатин, глицерин, натрия бензоат Е-211, вода очищенная, титана диоксид Е-171, краситель: красный очаровательный Е-129.

**Описание.** Капсулы мягкие желатиновые продолговатой формы со швом, упругие, красного цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Комбинации витаминов.  
Код АТХ А11JА.

#### **Показания к применению:**

- дефицит витаминов А, С, Е;
- профилактика гиповитаминоза;
- для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям;
- в период выздоровления и после перенесенных заболеваний или операционных вмешательств, во время и после лечения антибиотиками.

#### **Применение у детей**

Антиоксикапс не рекомендован к приему у детей младше 14 лет.

#### **Применение у лиц с нарушенной функцией печени и почек**

Рекомендуется применять препарат с осторожностью.

#### **Применение у пожилых людей**

Коррекции дозы для пожилых пациентов не требуется.

#### **Противопоказания**

Противопоказанием к применению препарата является повышенная чувствительность к его компонентам, гипероксалурия, беременность, возраст до 14 лет.

*С осторожностью* следует принимать при повышенном риске тромбозмболий, тяжелом кардиосклерозе, инфаркте миокарда.

#### **Беременность и период грудного вскармливания**

В связи с тем, что клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат в этот период применять не следует.

#### **Способ применения и дозы**

Антиоксикапс принимают после еды, запивая водой.

Взрослым препарат рекомендуется назначать по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 1-2 месяцев курсами несколько раз в год.

Пациентам с нарушениями функции печени и почек рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### ***Побочное действие***

При применении препарата в рекомендуемых дозах побочных действий не наблюдается.

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Тошнота, рвота, спазмы желудка.

Приливы или покраснения кожи, головная боль, умеренное увеличение мочеиспускания при дозах витамина С свыше 600 мг в день.

Большие дозы аскорбиновой кислоты (более 1 г в день) могут вызвать диарею.

При длительном приеме высоких доз бета-каротина, содержащегося в капсулах, может появляться пожелтение кожи и изменение цвета мочи. Эти явления безопасны, не требуют отмены лечения и исчезают после прекращения приема лекарственного средства.

При появлении перечисленных реакций, а так же реакций, не упомянутых в данной инструкции, необходимо обратиться к врачу.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами***

Не принимать одновременно с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки.

Одновременное применение аскорбиновой кислоты и алюминий-содержащих антацидов может увеличить экскрецию алюминия. Поэтому одновременное назначение антацидов и препарата не рекомендуется, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.

Одновременное применение аспирина и кислоты аскорбиновой может влиять на всасывание витамина С. Почечная экскреция салицилатов не изменяется и противовоспалительное действие аспирина не уменьшается.

Одновременное назначение аскорбиновой кислоты с дефероксамином увеличивает экскрецию железа и усиливает тканевую токсичность железа особенно для сердечной мышцы. У пациентов с идиопатическим гемохроматозом и талассемией, получавшим дефероксамин и аскорбиновую кислоту, были зарегистрированы случаи кардиомиопатии и застойной сердечной недостаточности. У этих больных аскорбиновую кислоту следует применять с осторожностью, отсрочено от дефероксамина и мониторировать сердечную функцию.

Аскорбиновая кислота может влиять на результаты биохимических определений креатинина, мочевой кислоты и глюкозы в образцах крови и мочи.

Неомицин препятствует всасыванию витамина А.

Витамин Е может усугубить последствия дефицита витамина К, влияя таким образом на свертываемость крови. Витамин Е может влиять на абсорбцию витамина А.

### ***Передозировка***

При соблюдении указаний по дозированию даже при длительном приеме препарата явлений передозировки не наблюдается.

Аскорбиновая кислота может вызывать ацидоз или гемолитическую анемию у некоторых людей с дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы. При массивной передозировке аскорбиновой кислоты может развиваться почечная недостаточность.

Прием высоких доз витамина А и бета-каротина может быть причиной тошноты, рвоты, головной боли, головокружения, болей в костях и суставах, нарушения функций печени, зрения, координации и окрашивания кожи и ногтей в желтый цвет.

При очень высоких дозах витамина Е могут наблюдаться признаки, связанные с антагонизмом с другими жирорастворимыми витаминами (витаминами А, D, К): головная боль, усталость, тошнота, двоение в глазах, мышечная слабость, легкая креатинурия и желудочно-кишечные расстройства.

Токсический эффект относительной передозировки витамина Е связан также с угнетением кислородозависимой функции макрофагов и как следствие завершения фагоцитоза. В связи с уменьшением уровня протромбина, нарушением функции тромбоцитов и антагонистическими взаимоотношениями витаминов Е и К могут быть геморрагические осложнения.

*Лечение:* активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

При случайной передозировке обратиться к врачу.

#### ***Меры предосторожности***

Не превышать рекомендуемую дозировку.

#### ***Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой***

Не влияет.

#### ***Форма выпуска***

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке.

#### ***Условия хранения***

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранят в недоступном для детей месте.

#### ***Срок годности***

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### ***Условия отпуска.***

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,  
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26

тел./факс (+ 37517) 344-18-66

e-mail: [info@mic.by](mailto:info@mic.by), [www.mic.by](http://www.mic.by)