



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД (ацикловир), 200 мг, 400 мг, таблетки**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
3. Применение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД,
и для чего его применяют**

Действующим веществом препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД является ацикловир, который относится к группе лекарств, называемых противовирусными препаратами. Ацикловир работает, убивая или останавливая рост вирусов. АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД используется для:

- лечения ветряной оспы, опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая);
- лечения герпеса, генитального герпеса и других инфекций, вызванных вирусом простого герпеса;
- профилактики обострений этих инфекций после того, как они у вас возникли;
- профилактики обострений этих инфекций у людей с ослабленной иммунной системой, когда организм менее способен бороться с инфекциями.

**2. О чем следует знать перед применением препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД
Не принимайте АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, если:**

- у вас аллергия на ацикловир или валацикловир или любой из компонентов препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из вышеперечисленного, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у вас проблемы с почками;
- вам больше 65 лет.

Если вы не уверены, применимо ли к вам что-либо из вышеперечисленного, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

Во время приема АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД важно пить много воды.



Другие препараты и АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится и к препаратам, отпускаемым без рецепта врача, в том числе лекарственным травам. Сообщите врачу, если вы принимаете:

- пробенецид, который применяется для лечения подагры;
- циметидин, который применяется для лечения язвы желудка;
- микофенолят мофетил, предотвращающий отторжение пересаженных органов.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед применением АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД может вызывать вялость или сонливость. При появлении этих симптомов откажитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами и обратитесь к врачу.

Важная информация о некоторых компонентах лекарственного препарата

В состав таблеток АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД входит лактоза. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть по сути не содержит натрия.

3. Применение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Доза, которую вы должны принять, будет зависеть от того, для чего вам назначил АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД ваш лечащий врач.

Лечение ветряной оспы, опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая):

- обычная доза составляет 800 мг 5 раз в день каждые 4 часа;
- предлагаемое время: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 и 23:00;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД 7 дней.

Лечение герпеса, генитального герпеса и других инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:

- обычная доза составляет 200 мг 5 раз в день каждые 4 часа;
- предлагаемое время: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 и 23:00;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД 5 дней или дольше, если вам назначит врач.

Профилактика обострений этих инфекций после того, как они у вас возникли:

- обычная доза составляет 200 мг 4 раза в день каждые 6 часов;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД до тех пор, пока врач не скажет вам прекратить.

Профилактика обострений этих инфекций у людей с ослабленной иммунной системой, когда организм менее способен бороться с инфекциями:

- обычная доза составляет 200 мг 4 раза в день каждые 6 часов;
- вам следует принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД до тех пор, пока врач не скажет вам прекратить.

Ваш врач может скорректировать дозу АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, если:

- лекарство принимает ребенок



- вам больше 65 лет

- у вас проблемы с почками. Если у вас проблемы с почками, важно пить много воды во время лечения АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД.

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, если к вам применимо что-либо из вышеперечисленного.

Способ применения

По возможности проглатывайте таблетки целиком после еды, запивая достаточным количеством жидкости (например, одним стаканом воды).

Риска/насечка на таблетке нанесена для облегчения разламывания таблетки при возникновении затруднений при ее проглатывании целиком.

Таблетки ацикловира не подходят для детей младше 6 лет, которые могут испытывать трудности при глотании. Для детей этого возраста рекомендуется использовать более подходящие лекарственные формы выпуска (например, жидкие).

Если вы приняли препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД больше, чем следовало

АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД обычно не опасен, если только вы в течение нескольких дней не принимали слишком большую дозу. Обратитесь к врачу, если вы приняли слишком много АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД. Возьмите с собой упаковку препарата.

Если вы пропустили прием препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД

Если вы забыли принять АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, примите его, как только вспомните. Однако, если уже пришло время приема следующей дозы, пропустите забытую дозу. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

Если вы досрочно прекращаете прием препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД

Ваш лечащий врач сообщит вам, как долго нужно принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД. Если вы досрочно прекратите прием препарата, это может привести к возврату заболевания.

При наличии дополнительных вопросов по применению данного препарата обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме этого лекарства могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

Аллергические реакции (редко: могут возникнуть менее чем у 1 человека из 1000)

Если у вас развилась аллергическая реакция, **прекратите принимать АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД и немедленно обратитесь к врачу**. Признаки могут включать:

- сыпь, зуд или крапивница на коже;
- отек лица, губ, языка или других частей тела;
- одышка, хрипы или затрудненное дыхание;
- падение кровяного давления (коллапс).

Другие возможные нежелательные реакции включают:

Часто (могут проявляться менее чем у 1 из 10 человек):

- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боли в животе;
- зуд, сыпь, в том числе кожная реакция, возникающая после воздействия света (светочувствительность);
- повышенная утомляемость;



- необъяснимая лихорадка и чувство слабости, особенно при вставании.

Нечасто (могут проявляться менее чем у 1 из 100 человек):

- зудящая сыпь, похожая на крапивницу;
- выпадение волос.

Редко (могут проявляться менее чем у 1 из 1000 человек):

- повышение количества креатинина и мочевины в крови;
- повышение количества билирубина и печеночных ферментов;

Очень редко (могут проявляться менее чем у 1 из 10 000 человек):

- снижение количества эритроцитов (анемия);
- снижение количества лейкоцитов (лейкопения);
- снижение количества тромбоцитов (клеток, которые способствуют свертыванию крови) (тромбоцитопения);
- чувство волнения или замешательства;
- неспособность ясно мыслить или судить (спутанность сознания);
- дрожь или тремор;
- шаткость при ходьбе и нарушение координации;
- нарушения речи;
- галлюцинации (видеть или слышать то, чего нет);
- судороги;
- чувство необычной сонливости или вялости;
- паралич части или всего тела;
- нарушения поведения, речи и движений глаз;
- жесткость шеи и чувствительность к свету;
- потеря сознания (кома);
- воспаление печени (гепатит);
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
- проблемы с почками, при которых у вас мало или совсем нет мочи;
- боль в пояснице, в области почек или чуть выше бедра (почечная боль).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Датой истечения срока годности является последний день месяца, предшествующего указанному на упаковке.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Действующее вещество – ацикловир. Каждая таблетка содержит 200,0 мг или 400,0 мг ацикловира.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), повидон К 30, магния стеарат, лактоза моногидрат.

Внешний вид препарата АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД и содержимое упаковки
АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД, таблетки, представляют собой:



- дозировка 200 мг: таблетки круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской с одной стороны, белого или почти белого цвета. Риска не предназначена для деления таблетки на равные части, но может применяться для разламывания таблетки с целью облегчения ее проглатывания;

- дозировка 400 мг: таблетки капсуловидные, двояковыпуклые, белого или почти белого цвета, с насечкой с одной стороны. Насечка не предназначена для деления таблетки на равные части, но может применяться для разламывания таблетки с целью облегчения ее проглатывания.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Одну, две или три контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации:

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.