


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по медицинскому применению лекарственного средства

### ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО

**Торговое название:** Вазелиновое масло.

**Форма выпуска:** масло.

**Описание:** бесцветная, прозрачная маслянистая жидкость без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство.

**Код АТХ** A06AA01.

#### **Показания к применению**

Внутрь – запоры у взрослых.

Наружно – перед проведением медицинских процедур для смазывания на-  
конечника клизмы, газоотводной трубы.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к лекарственному средству, острые воспа-  
лительные процессы органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язвенная  
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит), кишечная не-  
проходимость, кишечное кровотечение, лихорадочный синдром, геморрой, бере-  
менность, период менструации, детский возраст до 18 лет.

Не применять при отравлении жирорастворимыми соединениями (фосфор,  
бензол и др.). Не применять внутрь одновременно с жирорастворимыми анти-  
гельминтными средствами.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

## **Способ применения и дозы**

Внутрь взрослым по 15-30 мл (1-2 столовые ложки) один раз в день через 2 ч после еды. Курс лечения – не более 5 дней.

## **Передозировка**

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение симптоматическое.

## **Побочное действие**

Длительное применение может вызвать нарушение процесса пищеварения, атонию кишечника, тошноту, анорексию, гиповитаминоз А, D, Е, K, раздражение и зуд в области заднего прохода. В отдельных случаях возможны аллергические реакции (гиперемия, зуд).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Усиливает побочные эффекты жирорастворимых антигельминтных средств.

Не следует назначать лекарственное средство беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

В период кормления грудью применяют только по назначению врача с учетом соотношения польза для матери/риска для ребенка.

У детей может применяться только как наружное средство.

## ***Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы***

Данные отсутствуют.

## **Меры предосторожности**

Перед применением взбалтывают.

После прекращения курса приема внутрь масло вазелиновое может некоторое время выделяться из заднего прохода и загрязнять белье.

## **Упаковка**

30 мл во флаконах из стекла. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

## **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Лекарственное средство нельзя использовать позже срока, указанного на упаковке.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.