

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ВАЛИДОЛ-ФАРМСТАНДАРТ

Торговое название: Валидол-Фармстандарт

Международное непатентованное название: отсутствует

Лекарственная форма: таблетки подъязычные

Описание. Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета с сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические с фаской и риской и с характерным запахом ментола.

Состав

Активное вещество: левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) – 60 мг;

Вспомогательные вещества: сахар белый, декстроза моногидрат (глюкоза моногидрат), кальция стеарат.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие комбинации лекарственных средств для лечения заболеваний сердца.

Код АТХ С01ЕХ

Фармакологические свойства

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний.

Показания к применению

Применяют в комплексной терапии при неврастении и функциональной кардиалгии. Применение по указанным назначениям основывается исключительно на опыте

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- выраженная артериальная гипотензия;
- острый инфаркт миокарда;
- детский возраст до 18 лет;
- пациентам с эпилепсией и судорожным синдромом в анамнезе (включая фебрильные судороги);
- сахарный диабет;
- нарушение толерантности к углеводам.

С осторожностью: желудочно-пищеводный рефлюкс, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, воспалительные и язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, склонность к бронхоспазму и ларингоспазму.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования по оценке взаимодействия не проводились. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение у детей


Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период кормления грудью не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).



Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Таблетку следует держать во рту под языком до полного растворения.

Принимают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5–10 минут после приема препарата необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии.

Передозировка

В случае передозировки возможны головная боль, тошнота, диарея, образование ректальных язв, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления, дыхательные расстройства, нарушения ритма сердца, Л. А. С. К. В. И. Н. О. возбуждение, эпилептические судороги, потеря сознания и другие нарушения со стороны центральной нервной системы.

В случае передозировки необходимо отменить препарат. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

В случае, если боль в области сердца не проходит после приема лекарственного средства, необходимо исключить острый коронарный синдром. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Лекарственное средство содержит сахарозу. Пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Лекарственное средство содержит глюкозу. Пациентам с глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

1 таблетка содержит хлебных единиц – 0,096–0,116 ХЕ (0,106 ХЕ).

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций (сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек), тошноты, изжоги, слезотечения, головокружения, сонливости, снижения артериального давления.

Контактная аллергия на ментол может сопровождаться появлением жжения и изъязвлений в полости рта, лихеноидных высыпаний. Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться головной болью, брадикардией, мышечным тремором, атаксией, анафилактическим шоком, эритематозной кожной сыпью. Частота не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Форма выпуска

Таблетки подъязычные 60 мг.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке.

1 контурную ячейковую упаковку вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

5415 - 2019

Наименование и адрес изготовителя/организации, принимающей претензии:

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, Б. Курск, Р-ая Агрегатная, 1а/18,
тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru

СОТРАСОВИТА
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь