



ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
ОКСОЛИН

Торговое название: Оксолин.

Международное непатентованное название: нет.

Форма выпуска: мазь назальная 2,5 мг/г.

Описание: мазь от белого до желтого цвета, допускается розовый оттенок.

Состав на одну тубу: активное вещество - оксолин – 37,5 мг;

вспомогательные вещества: парафин жидкий, парафин мягкий, белый.

Фармакотерапевтическая группа: Противовирусное средство для местного применения.

Код ATC: D06BB.

Фармакологическое действие

Препарат обладает вирулицидным действием на вирус гриппа при непосредственном контакте с вирусодержащим материалом, препятствует репликации вируса в клетках, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа A2) с поверхностью клеточной мембранны.

Показания к применению

Мазь показана для профилактики гриппа, а также для лечения ринитов вирусной этиологии.

Способ применения и дозы

Местно. С целью индивидуальной профилактики гриппа мазь применяют путем ежедневного смазывания слизистой оболочки носа 2 раза в день (утром и вечером) в период эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Для лечения вирусного ринита мазью смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день на протяжении 3-4 дней.

Побочное действие

В отдельных случаях в месте нанесения мази возможны гиперемия и зуд слизистых оболочек, склеропроходящее чувство жжения, ринорея, легко смываемое синее окрашивание кожи. Эти явления вскоре проходят самостоятельно без дополнительного лечения или отмены лекарственного средства.

В случае возникновения вышеуказанных побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

Случаев передозировки при применении лекарственного средства не описано.

Меры предосторожности

Мазь не предназначена для применения при вирусных поражениях глаз.

Применение у детей. Применять с осторожностью детям до 2 лет.

Применение во время беременности и в период лактации. Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами. Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Негативных проявлений при совместном применении с другими лекарственными средствами не выявлено.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 °C до 8 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 15 г в тубах. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:
РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

