



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ЛОРСЕПТ

информация для пациентов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Лорсепт

Международное непатентованное название: Cetylpyridinium

Описание: Таблетки круглые, двояковыпуклые, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Состав на одну таблетку:

Состав таблеток для рассасывания с вишневым вкусом:

активное вещество: цетилпиридиния хлорид 1,5 мг;

вспомогательные вещества: повидон К30, ароматическая добавка «Вишня» (мальтодекстрин, аравийская камедь (E414), ароматическая композиция), ментол, кальция стеарат, тальк, сорбитол.

Состав таблеток для рассасывания с клубничным вкусом:

активное вещество: цетилпиридиния хлорид 1,5 мг;

вспомогательные вещества: повидон К30, ароматическая добавка «Клубника» (мальтодекстрин, аравийская камедь (E414), пропиленгликоль (E1520), ароматическая композиция), ментол, кальция стеарат, тальк, сорбитол.

Состав таблеток для рассасывания с малиновым вкусом:

активное вещество: цетилпиридиния хлорид 1,5 мг;

вспомогательные вещества: повидон К30, ароматическая добавка «Малина» (мальтодекстрин, пропиленгликоль (E1520), ароматическая композиция), ментол, кальция стеарат, тальк, сорбитол.

Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания.

Фармакотерапевтическая группа:

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Показания к применению:

Местное вспомогательное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и глотки.

Способ применения и дозы:

Взрослые и подростки: медленно рассасывать по 1 таблетке каждые 2 часа. Суточная доза не должна превышать 8 таблеток.

Дети старше 6 лет: медленно рассасывать по 1 таблетке каждые 4 часа. Суточная доза не должна превышать 4 таблеток.

Особые категории пациентов:

Пациенты с нарушением функции печени – с осторожностью (см. раздел «Меры предосторожности»).

Пациенты с нарушением функции почек – нет данных о необходимости коррекции дозы.

Пациенты пожилого возраста – нет данных о необходимости коррекции дозы.

Побочные действия:

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: изъязвления слизистой оболочки полости рта, преходящее коричневатое окрашивание языка и зубов, ощущение жжения, тошнота, рвота.

Частота вышеперечисленных нежелательных реакций неизвестна.

Возможно нарушение заживления ран и повреждений слизистой оболочки.

Возможно развитие сенсибилизации к цетилпиридинию.

Противопоказания:

Гиперчувствительность к цетилпиридинию, ментолу и другим вспомогательным компонентам препарата.

Гиперчувствительность дыхательных путей, бронхоспастические реакции, бронхиальная астма.

Наличие судорог (в том числе, фебрильных) у детей в анамнезе.

Не применять в области ран или повреждений слизистой оболочки.

Детский возраст до 6 лет.

Передозировка:

Случаи передозировки цетилпиридилия не описаны. Высокие пероральные дозы катионных поверхностно-активных веществ, таких как хлорид цетилпиридилия, могут вызывать тошноту, рвоту, судороги, нарушение кровообращения и кому. При передозировке не исключается развитие гемолиза.

Следует принять меры для уменьшения всасывания препарата. При необходимости – промывание желудка. Назначается симптоматическая терапия.

Меры предосторожности:

В случае подозрения на развитие бактериальной инфекции необходимо назначение системной антибиотикотерапии.

При вирусных поражениях слизистой оболочки полости рта монотерапия цетилпиридилием должна быть критически пересмотрена.

Цетилпиридилия хлорид не следует использовать при повреждении слизистых оболочек из-за возможных проблем с заживлением ран.

Пациенты с контактной аллергией не должны использовать цетилпиридилий.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не следует принимать данное лекарственное средство.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Из-за отсутствия достаточных данных, применение при беременности и кормлении грудью не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другими формами взаимодействия:

Четвертичные аммониевые соединения инактивируются белками сыворотки крови, гнойным экссудатом, а также фосфолипидами и другими липидсодержащими веществами.

Не рекомендуется таблетки для рассасывания запивать молоком, так как возможно снижение антимикробной активности.

Использование анионных ПАВ (например, зубная паста) снижает эффективность цетилпиридилия хлорида.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами:

Не влияет.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °С.

Срок годности: 3 года. *Не применять по истечении срока годности!*

Условия отпуска: Без рецепта врача.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Упаковка:

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из полимерной пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По две, три или пять контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел.: +375(212) 36-47-77
тел./факс: +375(212) 36-37-06, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь