

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Глюкоза,
таблетки жевательные с ароматом клубники
(или лимона, или апельсина, или вишни, или тропических фруктов) 2000 мг

Общая характеристика.

Международное непатентованное название. Glucose.

Описание. Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской, с фаской, с ароматом клубники (или лимона, или апельсина, или вишни, или тропических фруктов). Риски не предназначена для деления таблетки на две равные части.

Состав. Каждая таблетка содержит глюкозы моногидрат – 2000 мг, что эквивалентно 1818 мг глюкозы;

вспомогательные вещества: картофельный крахмал, тальк, кальция стеарат, лимонная кислота моногидрат, ароматизатор:

- «Клубника RX1534» (мальтодекстрин, вкусоароматический компонент) – для таблеток с ароматом клубники;

- «Лимон RX1548» (мальтодекстрин, вкусоароматический компонент) – для таблеток с ароматом лимона;

- «Апельсин RX1488» (декстроза, вкусоароматический компонент, антислеживающий агент: диоксид кремния E551 (5 %), соль поваренная пищевая йодированная (содержит антислеживающий агент: ферроцианид калия E536)) – для таблеток с ароматом апельсина;

- «Вишня RX1503» (декстроза-87 %, вкусоароматический компонент, антислеживающий агент: диоксид кремния E551 (5 %)) – для таблеток с ароматом вишни;

- «Тропик RX1603» (декстроза, вкусоароматический компонент, антислеживающий агент: диоксид кремния E551 (5 %)) – для таблеток с ароматом тропических фруктов.

Лекарственная форма. Таблетки жевательные с ароматом клубники (или лимона, или апельсина, или вишни, или тропических фруктов).

Фармакотерапевтическая группа. Питательные вещества. Углеводы. Глюкоза.

Код АТХ: V06DC01.

Фармакологическое действие. Глюкоза участвует в различных процессах обмена веществ в организме, усиливает окислительно-восстановительные процессы в организме, улучшает антитоксическую функцию печени. Усваивается полностью организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания к применению. Гипогликемия.


Способ применения и дозы. Принимают внутрь по 1-3 таблетки (2000-6000 мг) на прием, в зависимости от характера и течения гипогликемии. Таблетки следует разжевывать или рассасывать. При необходимости доза может быть увеличена. Повторный прием возможен с учетом массы тела, не превышая дозы 0,3г/кг/час.

Дети. Детям с 6-ти лет.

Доза и длительность курса определяются врачом.

Побочное действие. Снижение аппетита, гипергликемия (при сахарном диабете или передозировке). При употреблении в рекомендуемых дозах побочных реакций не наблюдается.

Противопоказания. Гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), сахарный диабет (кроме случаев гипогликемии), повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам лекарственного средства, непереносимость глюкозы и галактозы или мальабсорбция галактозы (галактоземия), детский возраст до 6 лет.



Передозировка. *Симптомы:* тошнота, вздутие живота, понос.

Лечение: прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности. Лекарственное средство не рекомендуют принимать больным с пониженной толерантностью к глюкозе. Таблетки глюкозы являются источником легкодоступного питательного вещества, однако, не являются полноценным заменителем сбалансированного питания.

Применение при беременности и в период лактации. Дети. При употреблении лекарственного средства при беременности и в период лактации, а также детям, необходимо соблюдать дозирование и длительность курса приема, назначенные врачом.

Влияние на способность вождения автомобилем и работу с движущимися механизмами. Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Случаев несовместимости с лекарственными средствами не выявлено.

Условия хранения и срок годности. В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 15 таблеток в упаковку блистерную из полимерных материалов (ПЭТФ).

Упаковку блистерную помещают в материал упаковочный (пленка полипропиленовая/пленка полипропиленовая металлизированная) или в упаковочную ленту, выполненную флексографским способом печати, ламинированную (пленка полипропиленовая/пленка полипропиленовая металлизированная).

Информация о производителе.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.