

НД РБ

6556 -2017


ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациента)

по медицинскому применению препарата

ЛОРИСИЛС

(Lorisils)



Торговое название: Лорисилс

Международное название: 2,4-дихлорбензиловый спирт/

Амилметакрезол

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав

Каждая таблетка для рассасывания с ментолом и маслом эвкалипта содержит:

Действующие вещества:

2,4-дихлорбензиловый спирт – 1.2 мг,

амилметакрезол – 0.6 мг;

Вспомогательные вещества:

Ментол, масло эвкалипта, сахар, жидкая глюкоза, краситель бриллиантовый голубой (Е 133), лимонная кислота.

Описание:

Зеленовато-голубого цвета круглые таблетки для рассасывания с запахом ментола и эвкалипта.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТХ: R02AA20

Показания к применению

Для облегчения симптомов инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Способ применения и дозы

Рекомендуется взрослым по 1 таблетке каждые 2-3 ч., максимальная суточная доза -12 таблеток.

Детям старше 12 лет по 1 таблетке каждые 2-3 ч., максимальная суточная доза -8 таблеток.

Необходимо рассасывать таблетки до полного растворения.

Дозы, рекомендуемые лицам пожилого возраста и пациентам моложе 65 лет — идентичны.

Если пропущен очередной прием препарата, не следует принимать пропущенную дозу, а продолжить прием в установленном режиме.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий препарата Лорисилс с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- детский возраст до 12 лет

Побочное действие

Редко: аллергические реакции

При появлении перечисленных побочных реакций, а также побочной реакции, не упомянутой в инструкции по применению, необходимо обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Беременным и кормящим женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Больные сахарным диабетом должны учитывать - содержание сахара в таблетке около 2,4 г.

Не следует применять препарат пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, глюкозы-галактозы, сахарозы-изомальтозы в связи с наличием в составе сахара и глюкозы.

Если симптомы заболевания сохраняются более 3-х дней, необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.


Лечение: промывание желудка, при необходимости – симптоматическая терапия. Специфического антидота не существует, не выводится путем диализа.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения Лорисилс с ментолом и маслом эвкалипта при беременности и кормлении грудью не изучалась, поэтому применение препарата не рекомендовано.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами.



НД РБ

6556 -2017

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Срок годности

3 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

6 таблеток в стрипе , 4 стрипа в пачке картонной.

Фирма-производитель, страна

Аария Лайфсайнсиз Пвт. Лтд., Индия.



ИНСТРУКЦИЯ


(информация для пациента)

по медицинскому применению препарата

ЛОРИСИЛС

(Lorisils)

Торговое название: Лорисилс

Международное название:
Амилметакрезол

2,4-дихлорбензиловый спирт/

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав

Каждая таблетка для рассасывания содержит:

Действующие вещества:

2,4-дихлорбензиловый спирт – 1.2 мг,

амилметакрезол – 0.6 мг;

Вспомогательные вещества:

Лорисилс, таблетки для рассасывания со вкусом клубники:

Ментол, ароматизатор «Клубника», сахар, жидкая глюкоза, краситель пунцовый 4R (E 124), лимонная кислота.

Лорисилс, таблетки для рассасывания со вкусом апельсина:

Ментол, ароматизатор «Апельсин», сахар, жидкая глюкоза, краситель апельсиновый желтый (E 110), лимонная кислота.

Лорисилс, таблетки для рассасывания со вкусом меда и лимона:

Ментол, ароматизатор «Мед», ароматизатор «Лимон», сахар, жидкая глюкоза, краситель карамель (E 150a), лимонная кислота.

Описание:*Лорисилс, таблетки для рассасывания со вкусом клубники:*

Красного цвета круглые двояковыпуклые таблетки для рассасывания с запахом клубники.

Лорисилс, таблетки для рассасывания со вкусом апельсина:

Оранжевого цвета круглые двояковыпуклые таблетки для рассасывания с запахом апельсина.

Лорисилс, таблетки для рассасывания со вкусом меда и лимона:

Коричневато-оранжевого цвета круглые двояковыпуклые таблетки для рассасывания с запахом меда и лимона.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТХ: R02AA20

Показания к применению

Для облегчения симптомов инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Способ применения и дозы

Рекомендуется взрослым и детям старше 6 лет по 1 таблетке каждые 2-3 ч. , максимальная суточная доза -12 таблеток.

Необходимо рассасывать таблетки до полного растворения.

Дозы, рекомендуемые лицам пожилого возраста и пациентам моложе 65 лет — идентичны.

Если пропущен очередной прием препарата, не следует принимать пропущенную дозу, а продолжить прием в установленном режиме.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий препарата Лорисилс с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- детский возраст до 6 лет

Побочное действие

Редко: аллергические реакции

При появлении перечисленных побочных реакций, а также побочной реакции, не упомянутой в инструкции по применению, необходимо обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Беременным и кормящим женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Больные сахарным диабетом должны учитывать - содержание сахара в таблетке около 2,4 г.


Не следует применять препарат пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, глюкозы-галактозы, сахарозы-изомальтозы в связи с наличием в составе сахара и глюкозы.

Если симптомы заболевания сохраняются более 3-х дней, необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.



Лечение: промывание желудка, при необходимости – симптоматическая терапия. Специфического антидота не существует, не выводится путем диализа.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения комбинации 2,4-дихлорбензилового спирта и амилметакрезола при беременности и кормлении грудью не изучалась, но препарат не рассматривается как опасный. Перед применением лекарственного средства рекомендуется консультация врача.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Срок годности

3 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

6 таблеток в стрипе , 4 стрипа в пачке картонной.

Фирма-производитель, страна

Аария Лайфсайдсиз Pvt. Лтд., Индия.

