

19.04.2021

НД РБ

9437 - 2020

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



Аллервэй Экспресс таблетки, диспергируемые в полости рта, 5 мг

Перед тем, как начать принимать этот лекарственный препарат, внимательно прочтите листок-вкладыш, потому что он содержит важную информацию для Вас.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам придется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
- Этот лекарственный препарат прописан только Вам. Не передавайте его другим людям, т.к. он может нанести им вред, даже если у них такие же симптомы болезни, как у Вас.
- Если у Вас появятся побочные эффекты, включая любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше (см. Раздел 4), обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

Разделы листка-вкладыша

1. Что такое Аллервэй Экспресс и для чего он используется
2. Что следует знать перед приемом Аллервэй Экспресс
3. Как принимать Аллервэй Экспресс
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Аллервэй Экспресс
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

1. Что такое Аллервэй Экспресс и для чего он используется

Левосетиризин дигидрохлорид является активным ингредиентом лекарственного препарата Аллервэй Экспресс.

Аллервэй Экспресс - это противоаллергический препарат.

Показания к применению:

- Аллергический ринит, сезонный, многолетний и персистирующий (поллиноз).
- Аллергический конъюнктивит.
- Хроническая идиопатическая крапивница.


2. Что следует знать перед приемом Аллервэй Экспресс.

Не принимайте Аллервэй Экспресс

- если у Вас аллергия на левосетиризин дигидрохлорид, цетиризин, гидроксизин или любые другие ингредиенты этого лекарственного препарата (см. раздел 6).

19.04.2021

9437 - 2020



- если у Вас тяжелое нарушение функции почек (тяжелая почечная недостаточность: с клиренсом креатинина ниже 10 мл/мин).

Предупреждения и меры предосторожности

Перед приемом Аллервэй Экспресс проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом.

Если Вы не можете опорожнить мочевой пузырь (при таких состояниях, как травма спинного мозга или увеличенная простата), обратитесь за советом к своему лечащему врачу.

Если Вы страдаете эпилепсией или подвержены риску судорог, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, так как использование Аллервэй Экспресс может вызвать обострение судорог.

Если Вам назначено тестирование на аллергию, спросите своего лечащего врача, следует ли Вам прекратить прием Аллервэй Экспресс за несколько дней до тестирования. Этот лекарственный препарат может повлиять на результаты теста на аллергию.

Дети

Применение Аллервэй Экспресс не рекомендуется у детей младше 6 лет.

Другие лекарственные препараты и Аллервэй Экспресс

Сообщите своему лечащему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Аллервэй Экспресс, пища, напитки и алкоголь

Следует соблюдать осторожность, если Аллервэй Экспресс принимается одновременно с алкоголем или другими веществами, действующими на мозг.

У чувствительных пациентов одновременное применение Аллервэй Экспресс и алкоголя или других веществ, действующих на мозг, может вызвать дополнительное снижение бдительности и ухудшение работоспособности.

Аллервэй Экспресс можно принимать не зависимо от приема пищи.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете беременность, перед приемом этого лекарственного препарата проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом.


Управление транспортными средствами и другими механизмами

Некоторые пациенты, получающие Аллервэй Экспресс, могут испытывать сонливость, усталость и истощение. Соблюдайте осторожность при вождении или работе с механизмами, пока не узнаете, как этот лекарственный препарат влияет на Вас. Однако специальные исследования не выявили ухудшения умственной активности, способности реагировать или способности управлять транспортным средством у здоровых добровольцев после приема левоцетиризина в рекомендованной дозировке.

19.04.2021

9437 - 2020

НД РБ



3. Как принимать Аллервэй Экспресс

Всегда принимайте этот лекарственный препарат точно так, как Вам прописал врач или фармацевт. Если Вы не уверены, посоветуйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 6 лет - одна таблетка в день.

Специальные указания по способу применения для определенных групп населения:

Почечная и печеночная недостаточность

Пациентам с нарушением функции почек может быть назначена меньшая доза в зависимости от тяжести заболевания почек, а для детей требуется коррекция дозы с учетом массы тела. Доза будет определена Вашим лечащим врачом.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек нельзя принимать Аллервэй Экспресс.

Пациентам, у которых нарушена только функция печени, следует принимать обычную предписанную дозу.

Пациентам с нарушением функции печени и почек может быть назначена более низкая доза в зависимости от тяжести заболевания почек, а для детей требуется коррекция дозы с учетом массы тела. Доза будет определена Вашим лечащим врачом.

Пожилые пациенты в возрасте 65 лет и старше

У пожилых пациентов нет необходимости в коррекции дозы при условии нормальной функции почек.

Использование у детей

Аллервэй Экспресс не рекомендуется детям младше 6 лет.

Как и когда следует принимать Аллервэй Экспресс?

Только для перорального применения.

Положите таблетку на язык, где она сразу же начнет растворяться. Держите во рту в течение нескольких секунд до полного рассасывания.

Как долго нужно принимать Аллервэй Экспресс?

Продолжительность приема зависит от типа, продолжительности и течения Ваших жалоб и определяется Вашим лечащим врачом.


Если Вы приняли более высокую дозу Аллервэй Экспресс, чем предусмотрено

Если Вы приняли более высокую дозу Аллервэй Экспресс, чем предусмотрено, у Вас может возникнуть сонливость. Дети могут сначала проявлять возбуждение и беспокойство, за которыми следует сонливость.

Если вы считаете, что приняли более высокую дозу Аллервэй Экспресс, сообщите об этом своему лечащему врачу, который решит, какие действия следует предпринять.

19.04.2021

9437 - 2020

**Если Вы забыли принять Аллервэй Экспресс**

Если Вы забыли принять Аллервэй Экспресс, или приняли дозу ниже, чем назначено врачом, не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Если Вы перестанете принимать Аллервэй Экспресс

Прекращение лечения не должно иметь негативных последствий. Однако в редких случаях может возникнуть зуд (сильный зуд), если Вы прекратите прием Аллервэй Экспресс, даже если эти симптомы не присутствовали до начала лечения. Симптомы могут исчезнуть спонтанно. В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными, и может потребоваться возобновление лечения. Симптомы должны исчезнуть после возобновления лечения.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по использованию этого лекарственного препарата, спросите своего лечащего врача или фармацевта.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные препараты, Аллервэй Экспресс может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Часто: может наблюдаться у 1 человека из 10.

Сухость во рту, головная боль, усталость и сонливость

Нечасто: может наблюдаться у 1 человека из 100.

Истощение и боли в животе.

Неизвестно: частота не может быть оценена на основе имеющихся данных

Другие побочные эффекты, такие как учащенное сердцебиение, судороги, покалывание, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия (искажение вкусовых ощущений), чувство головокружения, нарушение зрения, помутнение зрения, окулогирация, болезненное или затрудненное мочеиспускание, невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь, отек, кожный зуд, сыпь, крапивница (отек, покраснение и зуд кожи), кожная сыпь, одышка, увеличение массы тела, мышечные боли. Также сообщалось о боли в суставах, агрессивном или возбужденном поведении, галлюцинациях, депрессии, бессоннице, навязчивых или суицидальных мыслях, кошмарах, гепатите, нарушении функции печени, рвоте, повышенном аппетите, тошноте и диарее. Зуд (сильный зуд) после прекращения приема.

При первых признаках реакции гиперчувствительности прекратите прием Аллервэй Экспресс и сообщите об этом своему лечащему врачу. Симптомы реакции гиперчувствительности могут включать: отек рта, языка, лица и/или горла, затрудненное дыхание или глотание (стеснение в груди или хрипы), крапивница, внезапное падение артериального давления, ведущее к коллапсу или шоку, что может быть фатальным.

Сообщение о побочных эффектах


Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, в том числе побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через:

19.04.2021

НД РБ

Веб-сайт: www.rceth.by

9437 - 2020



Сообщая о побочных эффектах, Вы можете предоставить больше информации о безопасности этого лекарственного препарата.

5. Как хранить Аллервэй Экспресс

Храните этот лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Храните при температуре не выше 25 °C в защищенном от влаги месте.

Не используйте этот лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте лекарственный препарат в канализацию или бытовые отходы. Спросите у фармацевта, как утилизировать лекарственный препарат, который Вы больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Аллервэй Экспресс

- Действующее вещество – левоцетиризин дигидрохлорид

Каждая таблетка, диспергируемая в полости рта, содержит 5 мг левоцетиризина дигидрохлорида

- Прочие ингредиенты: бетадекс, маннитол, кремния диоксид коллоидный безводный, крахмал кукурузный, лимонная кислота безводная, микрокристаллическая целлюлоза, кросповидон, аспартам, магния стеарат.

Как выглядит Аллервэй Экспресс и что содержится в упаковке

Круглые, от белого до почти белого цвета, плоские, с скошенными краями таблетки.

По 10 таблеток в блистере из алюминий/алюминиевой фольги, ламинированной ПЭТ/бумагой. По 2 блистера с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, 8-2-337, Рoad № 3, Баньяра Хиллс, Хайдерабад, Индия, тел. +91 40 4900 2900, факс +91 40 4900 2999, электронная почта: mail@drreddys.com
Атена Драг Деливери Солюшнз Пвт. Лтд., Индия