


Листок-вкладыш – информация для потребителя  
Фриангин, 1,5 мг/мл, спрей для местного применения  
(Бензидамина гидрохлорид)

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается через 3 дня или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.



**Содержание листка-вкладыша**

1. Что собой представляет препарат Фриангин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Фриангин.
3. Применение препарата Фриангин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фриангин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат Фриангин, и для чего его применяют**

Действующим веществом препарата Фриангин является бензидамина гидрохлорид. Фриангин относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), обладает местным противовоспалительным и противоотечным действием, а также оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта. Препарат Фриангин используется для симптоматического лечения раздражений и воспалительных состояний, включая сочетание с болевым синдромом

ротовой полости и горла (например, гингивит, стоматит, фарингит), а также после консервативного лечения или удаления зубов.

## **2. О чем следует знать перед применением препарата Фриангин**

**Не применяйте препарат Фриангин**, если у вас аллергия (гиперчувствительность) на бензидамина гидрохлорид или на какое-либо из вспомогательных веществ препарата, приведенных в разделе 6.

Препарат Фриангин не применяют у детей младше 4 лет.

Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением Фриангина.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Фриангин проконсультируйтесь с лечащим врачом, медицинской сестрой или работником аптеки:

- если у вас бронхиальная астма в анамнезе;
- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие НПВП.

У ограниченного числа пациентов присутствие язв в горле и полости рта может указывать на наличие более серьезной патологии. Если симптомы сохраняются у вас свыше 3 дней, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Другие препараты и препарат Фриангин**

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать любые другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта, так как лекарственные препараты могут изменять эффекты друг друга.

Взаимодействие препарата Фриангин с другими препаратами не установлено.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

#### *Беременность*

В случае если вы беременны, предполагаете, что беременны, или пытаетесь забеременеть, вам следует проконсультироваться со своим лечащим врачом о возможности применения препарата. Если беременность наступила в период лечения, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

#### *Грудное вскармливание*

Не следует применять препарат в период грудного вскармливания.

### **Управление транспортными средствами или работа с механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами при применении в рекомендованных дозах.

### **Важная информация о некоторых компонентах препарата**

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Препарат содержит метилпарагидроксibenзоат, способный вызвать аллергические реакции (в том числе замедленного типа).

Данный препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя) – около 14 мг на дозу (0,17 мл). В случае если вы занимаетесь спортом, вы должны помнить, что применение препаратов, содержащих этиловый спирт, может давать положительный результат теста на допинг.

### **3. Применение препарата Фриангин**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с вашим лечащим врачом.

#### **Способ применения**

Препарат распыляют на слизистую оболочку ротовой полости или горла.

#### **Рекомендуемая доза**

Применяйте препарат 2-6 раз в день. Одно распыление соответствует одной дозе препарата (0,17 мл раствора, что эквивалентно 0,255 мг бензидамина гидрохлорида).

#### **Взрослые и подростки старше 12 лет**

4-8 распылений 2-6 раз в день.

#### **Дети**

Дети (в возрасте 4-6 лет): 1 распыление на каждые 4 кг массы тела ребенка, максимальная доза 4 распыления 2-6 раз в день.

Дети (в возрасте 6-12 лет): 4 распыления 2-6 раз в день.

Не превышайте рекомендованную дозу. Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. Если после лечения в течение 7 дней улучшение не наступает или появляются новые симптомы, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### **Как использовать препарат Фриангин**

Препарат Фриангин распыляют на слизистую оболочку ротовой полости и горла. Сразу после применения спрея следует избегать приема пищи или жидкости.

Снимите защитный колпачок и поднимите насадку распылителя.

Введите насадку в ротовую полость и направьте ее в сторону воспаленной области. Нажмите на дозатор столько раз, сколько назначено доз. После использования опустите насадку распылителя.

**Если вы превысили рекомендуемую дозу или случайно приняли препарат Фриангин внутрь, вам следует обратиться за консультацией к лечащему врачу.**

**Если вы забыли принять препарат Фриангин**

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Если вы пропустили прием препарата Фриангин, вы должны принять следующую дозу в намеченное время.

Не применяйте двойную дозу препарата, чтобы восполнить пропущенную.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Фриангин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Некоторые нежелательные реакции могут быть серьезными: аллергическая реакция (анафилактический шок), признаки которой могут включать затрудненное дыхание, боль или стеснение в груди, чувство головокружения, обморок, сильный зуд или отечность кожи, отек лица, губ, языка или горла, и которые могут быть потенциально опасными для жизни.

Прекратите использование препарата Фриангин и обратитесь к лечащему врачу, если почувствуете любую из приведенных ниже нежелательных реакций:

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– фоточувствительность.

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

– аллергические реакции;

– ощущение жжения и сухость в ротовой полости.

**Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

– ларингоспазм;

– ангионевротический отек.

**Неизвестно** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

– анафилактические реакции.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### 5. Хранение препарата Фриангин

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Срок годности 2 года. Срок хранения после вскрытия упаковки – 30 дней.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

1 мл препарата содержит:

*Действующее вещество:* бензидамина гидрохлорид – 1,5 мг.

*Вспомогательные вещества:* этиловый спирт 96 %, глицерин, метилпарагидроксибензоат (E218), ароматизатор ментоловый (натуральные вкусоароматические вещества, 1,2-пропиленгликоль (E1520)), сахарин натрий, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, вода очищенная.

#### **Внешний вид препарата Фриангин и содержимое упаковки**

Фриангин, 1,5 мг/мл, спрей для местного применения представляет собой прозрачный бесцветный раствор.

По 30 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокой плотности, укупоренные насадкой распыляющей горланной с защитным колпачком. На каждый флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска:** без рецепта.

#### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

ООО «АмантисМед»

Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская 2и

тел/факс: (+375 1774) 25 286

e-mail: office@amantismed.by

#### **Листок-вкладыш пересмотрен:**

