

Листок-вкладыш. Информация для пациентов

06.09.2022

Ренгалин, раствор для приема внутрь гомеопатический

Антитела к брадикинину аффинно очищенные

Антитела к гистамину аффинно очищенные

Антитела к морфину аффинно очищенные



- Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку он содержит важную для Вас информацию.
- Данный гомеопатический лекарственный препарат отпускается без рецепта врача. Для достижения наилучших результатов данный гомеопатический лекарственный препарат следует применять в соответствии с указаниями, описанными в этом листке-вкладыше, рекомендациями врача или фармацевта.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние через 3 дня не улучшается или оно ухудшается, следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Ренгалин и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ренгалин.
3. Применение препарата Ренгалин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ренгалин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ РЕНГАЛИН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Область применения

Гомеопатический лекарственный препарат без одобренных показаний к применению.

Препарат Ренгалин, раствор для приема внутрь гомеопатический, предназначен для взрослых и детей (с 3 лет и старше) и традиционно применяется при кашле, сопровождающем острые инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА РЕНГАЛИН

Не применяйте препарат Ренгалин:

- если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас наследственная непереносимость фруктозы;
- если возраст вашего ребенка меньше 3 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ренгалин необходима консультация врача.

В состав препарата входит мальтитол, в связи с чем больные сахарным диабетом должны применять его с осторожностью. Следует помнить, что 5 мл препарата содержит 0,3 г мальтитола, что соответствует 0,02 хлебным единицам (ХЕ). Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте потребность в инсулине мала. Энергетическая ценность мальтитола 10 кДж или 2,4 ккал/г, что существенно меньше, чем у сахарозы. Энергетическая ценность 5 мл препарата составляет приблизительно 5,7 кДж (1,37 ккал).

Дети и подростки

Препарат Ренгалин не предназначен для детей младше 3 лет.

Другие препараты и препарат Ренгалин

Сообщите лечащему врачу, о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Случаев несовместимости препарата Ренгалин с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не зарегистрировано.

Препарат Ренгалин и прием пищи

Препарат Ренгалин принимают не во время приема пищи.



Беременность и грудное вскармливание

Безопасность применения препарата Ренгалин у беременных и в период грудного вскармливания не изучалась. Лекарственное средство не рекомендовано для применения беременным и кормящим грудью женщинам.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Ренгалин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕНГАЛИН

Всегда следует принимать препарат в полном соответствии с листком-вкладышем и с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Препарат Ренгалин предназначен для приема внутрь. На один прием по 5-10 мл, вне приема пищи. Желательно держать раствор во рту перед проглатыванием для максимального эффекта препарата.

Применять по 5-10 мл 3 раза в сутки. В зависимости от тяжести состояния в первые три дня частота приема может быть увеличена до 4-6 раз в сутки.

Продолжительность лечения составляет 7 дней.

Применение у детей

Не предназначен для детей младше 3 лет.

Если Вы приняли больше препарата Ренгалин, чем следовало

Если вы приняли слишком много раствора, немедленно сообщите об этом своему лечащему врачу.

При передозировке возможны диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея), обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами (мальтитол, глицерол).

Лечение – симптоматическое.

**Если Вы забыли принять препарат Ренгалин**

Если вы пропустили прием препарата Ренгалин, следует принять следующую дозу сразу, как только об этом стало известно, а следующую после этого приема очередную дозу следует принять в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы прекратили прием препарата Ренгалин

Вам необходимо посоветоваться с лечащим врачом, если Вы прекратили прием препарата до окончания намеченного срока лечения.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Ренгалин может вызвать нежелательные реакции, такие как аллергические реакции и проявления повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, однако они возникают очень редко.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; <http://www.rceth.by>).

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕНГАЛИН 9699 - 2022

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Срок годности: 3 года.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия флакон хранить при температуре не выше 25 °С в течение 35 дней.

Не выбрасывайте неиспользованный остаток препарата в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Ренгалин, раствор для приема внутрь гомеопатический, содержит

Состав на 100 мл

Активными веществами являются:

Антитела к брадикинину аффинно очищенные – 0,12 г*,

Антитела к гистамину аффинно очищенные – 0,12 г*,

Антитела к морфину аффинно очищенные – 0,12 г*.

* вводятся в виде смеси трех активных водных разведений субстанции, разведенной соответственно в 100¹², 100³⁰, 100⁵⁰ раз.

Прочими вспомогательными веществами являются: гипромеллоза 1,0 г, мальтитол 6,0 г, глицерол 3,0 г, калия сорбат 0,165 г, лимонная кислота безводная 0,02 г, вода очищенная до 100 мл.

Внешний вид препарата Ренгалин и содержимое упаковки

Бесцветная прозрачная жидкость.

По 100 мл во флаконы из окрашенного стекла, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия из полиэтилена высокой плотности, с капельницей из полиэтилена низкой плотности. Каждый флакон вместе с мерным стаканом из натурального полипропилена и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;
Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.
Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Адрес электронной почты: hotline@materiamedica.ru

Адрес места производства

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.



Вы можете сообщить о нежелательных реакциях на «горячую линию» компании-производителя/держателя регистрационного удостоверения по телефону: +7 (495) 681-09-30, +7 (495) 681-93-00 или по электронной почте: hotline@materiamedica.ru.

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Тел./факс: +375 (17) 323-58-68.

E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Листок-вкладыш пересмотрен
06.2021

НД РБ

9699 - 2022

Заместитель директора Департамента развития производства и регистрации

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

И.Ю. Краснова

