


03865-2018



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
СЕПТОМИРИН,**

раствор для наружного применения 0,1 мг/мл

Действующее вещество: бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]-аммония хлорид (в виде миритина (бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]-аммония хлорида, моногидрата))

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат СЕПТОМИРИН, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата СЕПТОМИРИН.
3. Применение препарата СЕПТОМИРИН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата СЕПТОМИРИН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат СЕПТОМИРИН,
и для чего его применяют**

Препарат СЕПТОМИРИН, раствор для наружного применения относится к группе антисептических и дезинфицирующих средств. СЕПТОМИРИН обладает широким спектром антимикробного, противовирусного и противогрибкового действия.

СЕПТОМИРИН применяют:

- в хирургии для профилактики нагноений и лечения гнойных ран, лечения гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата;
- в ожоговой медицине для лечения поверхностных и глубоких ожогов, подготовке ожоговых ран к операции по восстановлению кожного покрова (дерматопластике);
- в урологии – при остром и хроническом воспалении уретры, уретропростатите специфической (трихомоноз, хламидиоз, гонорея) и неспецифической природы;
- в гинекологии – при воспалительных заболеваниях женских половых органов, генитальном кандидозе, для профилактики инфицирования родовых травм;
- в стоматологии – при воспалении полости рта (стоматите), десен (гингивите) и околозубных тканей (периодонтите), для гигиенической обработки съемных зубных протезов;
- в дерматологии для лечения грибковых заболеваний кожи и слизистых, поражении кожи стоп и крупных складок, вызванных грибами;
- при заболеваниях ЛОР-органов – наружном воспалении уха и барабанной перепонки (тимпаните), воспалении слизистой оболочки гайморовой пазухи,

воспалении миндалин и горла;

– для экстренной профилактики заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес).

2. О чем следует знать перед применением препарата СЕПТОМИРИН

Применение препарата СЕПТОМИРИН противопоказано:

– при повышенной чувствительности к действующему веществу.

Особые указания и меры предосторожности

Во время применения препарата СЕПТОМИРИН следует избегать его попадания в глаза.

Дети и подростки

Опыт клинического применения у детей ограничен.

Перед применением у детей проконсультируйтесь с врачом для оценки соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения препарата СЕПТОМИРИН.

Другие препараты и СЕПТОМИРИН

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

При одновременном применении с антибиотиками отмечено усиление их противобактериальных и противогрибковых свойств.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Решение о применении препарата СЕПТОМИРИН во время беременности и грудного вскармливания принимается врачом. Возможно применение препарата, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата СЕПТОМИРИН не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата СЕПТОМИРИН

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Для наружного и местного применения.

Хирургия, травматология, ожоговая медицина: с профилактической и лечебной целью препарат применяют путем орошения поверхности ран, активного дренирования и использования марлевых тампонов, смоченных препаратом. Лечебная процедура повторяется 2-3 раза в сутки в течение 3-5 дней.

Акушерство, гинекология: с целью профилактики инфекции препарат применяется в виде влагалищных орошений, а также использования тампонов, смоченных препаратом. Для удобства влагалищного орошения рекомендуется использование насадки гинекологической. Насадку гинекологическую аккуратно вводят во влагалище и производят орошение содержимым бутылки.

Лечение воспалительных заболеваний проводится курсом в течение 2-х недель путем внутривлагалищного введения тампонов с препаратом на 2-3 часа, а также методом лекарственного электрофореза.

*Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем**

Содержимое флакона вводят в мочеиспускательный канал на 2-3 минуты: мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл). Обработать кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов. После процедуры рекомендуется не мочиться в течение 2-х часов. Препарат эффективен, если он применяется не позже 2-х часов после полового акта.

*При остром и хроническом воспалении уретры, уретропростатите**

Проводят впрыскивание в уретру 2-3 мл препарата 1-2 раза в день, курс – 10 дней.

** применение возможно для флаконов, укуренных резбовыми колпачками, или бутылок, укуренных крышками с насадкой.*

В дерматологии: при грибковых поражениях кожи и слизистых, крупных складок, кожи стоп стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными препаратом, притирают пораженный участок кожи. Применяется 3 раза в день на пораженных участках кожи.

При заболеваниях ЛОР-органов

При воспалительных заболеваниях горла и миндалин проводят полоскание горла 3-4 раза в сутки. Количество препарата на одно полоскание 10-15 мл.

При воспалительных заболеваниях уха и барабанной перепонки турунды (валики), смоченные раствором, вводить в наружный слуховой проход на 2-3 часа в течение 6-8 дней.

При гнойных гайморитах – во время пункции верхнечелюстная пазуха промывается достаточным количеством препарата.

При стоматитах, гингивитах, пародонтитах

Рекомендуется полоскание ротовой полости 10-15 мл препарата 3-4 раза в сутки.

Применение у детей

Во избежание проглатывания раствора, затекания его в носовые ходы и попадания в дыхательные пути перед полосканием горла необходимо убедиться, что ребенок понимает и владеет техникой полоскания горла. У детей младшего возраста во время полоскания горла требуется контроль со стороны взрослых.

Указания по использованию насадки гинекологической (апликатора):

1. Удалить крышку с бутылки.
2. Извлечь прилагаемую насадку гинекологическую из защитной упаковки.
3. Накрутить насадку на бутылку.
4. Аккуратно ввести насадку гинекологическую во влагалище, не доставляя дискомфорта, и произвести орошение.

Если вы применили препарата СЕПТОМИРИН больше, чем следовало
 Явления передозировки не описаны.

Если вы забыли применить препарат СЕПТОМИРИН .

Препарат следует применить при первой возможности, однако предварительно убедитесь, что вы не превышаете частоту применения, согласно назначению и режиму дозирования.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам СЕПТОМИРИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении СЕПТОМИРИНА возможно возникновение *аллергических реакций.*

Местно – чувство жжения в месте применения (проходит самостоятельно в течение 10-15 с и не требует отмены препарата).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата СЕПТОМИРИН

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 4 года.

Не применяйте препарат по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Действующим веществом препарата является бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]-аммония хлорид (в виде миритина (бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]-аммония хлорида, моногидрата) – 4 мг; 10 мг или 40 мг.
Вспомогательные вещества: вода очищенная.

Внешний вид препарата СЕПТОМИРИН и содержимое упаковки

СЕПТОМИРИН, раствор для наружного применения 0,1 мг/мл, – бесцветный прозрачный раствор, пенящийся при встряхивании.

По 40 мл в бутылки полиэтиленовые неокрашенные, укупоренные крышками.

По 100 мл во флаконы, укупоренные резьбовыми колпачками; или в бутылки, укупоренные крышками с насадкой, или в бутылки полиэтиленовые неокрашенные, укупоренные крышками, или в бутылки полиэтиленовые неокрашенные, укупоренные крышками в комплекте с насадкой гинекологической.

По 400 мл в бутылки полиэтиленовые черные, укупоренные колпачками.

На флакон или бутылку наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Каждый флакон или бутылку по 40 мл или 100 мл вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Бутылки полиэтиленовые неокрашенные по 100 мл вместе с листком-вкладышем и насадкой гинекологической помещают в пачку из картона.

Флаконы или бутылки по 100 мл и 400 мл вместе с равным количеством листов-вкладышей помещают в ящики из гофрированного картона или в термоусадочную пленку.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: