

НД РЕ

07605-2018



Листок-вкладыш – информация для потребителя
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, 30 мг/мл, раствор для наружного применения
(перекись водорода / hydrogen peroxide)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
3. Применение препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
и для чего его применяют**

Этот препарат содержит перекись водорода, дезинфицирующее и дезодорирующее средство. Убивает бактерии, путем выделения кислорода при контакте с тканями организма.

Применяется для:

- обработки небольших порезов, ран (в том числе гнойных), изъязвлений кожи, ожогов;
 - остановки незначительных кровотечений (поверхностных, носовых);
 - полоскания полости рта и горла (при стоматите, ангине).
- При гинекологических заболеваниях с целью дезинфекции.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА**

Не применяйте препарат ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА:

- если у вас аллергия на перекись водорода или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).
- на неповрежденной коже и глазах;
- в закрытых полостях тела и хирургических ранах;
- в качестве клизм;
- для дезинфекции хирургических инструментов.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Только для наружного применения.

Избегать попадания в глаза.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА не рекомендуется применять под давящие (окклюзионные) повязки.

Осветляет ткань.

Обработка раны раствором ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА не гарантирует защиту от заражения столбняком и др. раневой инфекцией.

Дети и подростки

Для полоскания полости рта и горла ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА применяется у детей с 12 лет. Применение у детей младшего возраста допускается только по назначению врача.

Другие препараты и препарат ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без рецепта.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА не следует применять местно одновременно со щелочными лекарственными препаратами.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Нет достоверных данных. Перед применением лекарственного препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА во время беременности и в период кормления грудью необходимо проконсультироваться с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Для наружного применения используют раствор 30 мг/мл; для полоскания полости рта и горла, нанесения на слизистые оболочки – раствор 2,5 мг/мл (раствор 30 мг/мл разводят водой в соотношении 1:11).

Неразбавленный раствор не применяют для обработки слизистых оболочек. Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором лекарственного препарата. Тампоны следует держать пинцетом.

Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Дети и подростки

Для полоскания полости рта и горла применяется у детей с 12 лет. Применение у детей младшего возраста допускается только по назначению врача.

Способ применения

Для наружного применения.

Если вы применили препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА больше, чем следовало

Случайное проглатывание может вызвать боль в горле, желудочные расстройства и рвоту. Внезапное поступление свободного кислорода в желудочно-кишечный тракт может

вызвать острое раздувание желудка и внутреннее кровотечение. ~~Разрешается пить воду.~~
Поступление больших объемов перекиси может привести к газовой эмболии, являющейся следствием высвобождения кислорода в желудок.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При обработке раны возможно возникновение чувства жжения.

При длительном применении для полосканий возможна гипертрофия сосочков языка, потеря чувствительности.

Возможно проявление местных аллергических реакций при индивидуальной непереносимости лекарственного препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас или у вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 мл препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА содержит: действующее вещество: перекись водорода (в виде перекиси водорода медицинской) – 30 мг; вспомогательные вещества: натрия бензоат, вода очищенная.

Внешний вид препарата ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА и содержимое упаковки

Бесцветная прозрачная жидкость.

По 40 мл, 100 мл, 200 мл или 400 мл в бутылках/флаконах, окрашенных в черный цвет, закупоренных крышками/колпачками, вместе с листком-вкладышем.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



НД РБ

07605-2016



За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.