



## Листок-вкладыш – информация для потребителя

### ГЕПАРИН, мазь для наружного применения

Действующие вещества: гепарин натрия + бензокайн (анестезин) + бензилникотинат

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

#### Содержание листка-вкладыша

- Что собой представляет препарат ГЕПАРИН, и для чего его применяют
- О чём следует знать перед применением препарата ГЕПАРИН
- Применение препарата ГЕПАРИН
- Возможные нежелательные реакции
- Хранение препарата ГЕПАРИН
- Содержимое упаковки и прочие сведения

#### 1. Что собой представляет препарат ГЕПАРИН, и для чего его применяют

ГЕПАРИН, мазь для наружного применения, – это комбинированное средство, которое при нанесении на кожу оказывает противовоспалительное действие, препятствует образованию тромбов и обладает местным обезболивающим действием.

Применяется при заболеваниях поверхностных вен (тромбофлебит), флебите (воспаление стенки вен) после проводимых инъекций, при воспалении наружных геморроидальных узлов.

Препарат ГЕПАРИН содержит три активных компонента:


- гепарин оказывает антиротромботическое действие и уменьшает воспалительный процесс;
- бензокайн (анестезин) оказывает обезболивающее действие;
- бензилникотинат расширяет поверхностные сосуды, способствуя всасыванию гепарина.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

#### 2. О чём следует знать перед применением препарата ГЕПАРИН

##### Не применяйте ГЕПАРИН:

- если у Вас повышенная чувствительность к гепарину, бензокайну (анестезину) и бензилникотинату, или любым другим компонентам препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас есть повреждения кожи (открытые инфицированные раны, язвенно-некротические процессы);
- если у Вас гипокоагуляция (снижение свертываемости крови) и тромбоцитопения



(уменьшение количества тромбоцитов), согласно анализам крови;

- при наличии у Вас в настоящий момент или в прошлом гепарин-индуцированной тромбоцитопении.

#### Дети и подростки

Применение противопоказано.

#### Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ГЕПАРИН проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- у Вас глубокий венозный тромбоз. В этом случае применение препарата противопоказано;
- у Вас в прошлом были тромбоэмболические осложнения. В период применения препарата Вам может потребоваться проведение дополнительных анализов для оценки количества тромбоцитов в крови с целью исключения развития системного действия гепарина (гепарин-индуцированной тромбоцитопении II типа);
- у Вас открытые раны и наличие гнойных процессов. В этом случае применение препарата противопоказано;
- Вы принимаете препараты, влияющие на свертывающую систему крови. Вам может потребоваться проведение дополнительных анализов для оценки показателей свертываемости крови.

При длительном курсе лечения и при обширных участках поражения женщинам в возрасте старше 65 лет и беременным женщинам может потребоваться проведение дополнительных анализов для оценки показателей свертываемости крови.

#### Важная информация о некоторых составляющих лекарственного препарата

Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, входящие в состав препарата, могут вызывать аллергические реакции. В таких случаях следует прекратить применение препарата.

#### Другие препараты и препарат ГЕПАРИН

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Также это относится к любым препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

Некоторые препараты можно применять вместе с препаратом ГЕПАРИН, а другие могут вызывать нежелательные реакции при совместном применении.

#### Взаимодействие со следующими препаратами может усиливать действие гепарина:

- антикоагулянты и антиагреганты (препараты, препятствующие тромбообразованию),
- нестероидные противовоспалительные препараты.

#### Взаимодействие со следующими препаратами может уменьшать действие гепарина:

- алкалоиды спорыньи,
- тироксин (используют при заболеваниях щитовидной железы),
- тетрациклин (антибиотик),
- антигистаминные средства (используются для лечения аллергии),
- никотин.

ГЕПАРИН не применяют местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклином и антигистаминными препаратами.

#### Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность применения препарата при беременности и в период кормления грудью не установлена. Гепарин не проходит через плацентарный барьер и не выделяется с

грудным молоком. Сведений о попадании других компонентов препарата в грудное молоко нет.

ГЕПАРИН применяют при беременности и в период грудного вскармливания только в случае, если применение абсолютно необходимо.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Влияние на способность управления автотранспортом или работу с механизмами не выявлено.

### **3. Применение препарата ГЕПАРИН**

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат ГЕПАРИН предназначен только для наружного применения.

#### **Режим дозирования и способ применения**

*Заболевания поверхностных вен (тромбофлебит), флебит после проводимых инъекций.*  
Нанесите мазь тонким слоем область поражения (0,5-1 г на участок диаметром 3-5 см) и осторожно вотрите в кожу.

#### *Воспаление наружных геморроидальных узлов*

Мазь следует нанести на бязевую или полотняную прокладку, которую накладывают непосредственно на геморроидальные узлы, и зафиксировать повязкой. С этой же целью можно использовать тампон, пропитанный гепариновой мазью, который следует вводить в задний проход.

#### **Применение у детей**

Применение у детей и подростков противопоказано.

#### **Если Вы применили препарата ГЕПАРИН больше, чем следовало**

Явлений передозировки при применении лекарственного препарата не описано.

Не превышайте рекомендуемую длительность применения препарата.

#### **Если Вы забыли применить препарат ГЕПАРИН:**

Нанесите мазь при первой возможности, однако предварительно убедитесь, что Вы не превышаете частоту применения (не более трех раз в сутки).

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, ГЕПАРИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

#### **При применении препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:**

- местные реакции: покраснение кожи, снижение чувствительности в месте применения, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.


### **5. Хранение препарата ГЕПАРИН**

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не используйте препарат по истечении срока годности.



Не применяйте препарат, если Вы заметили, что туба, в которой находится мазь, повреждена.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Одна туба 25 г содержит *действующие вещества*: гепарин натрия – 2500 МЕ, бензокайн (анестезин) – 1000,0 мг, бензилникотинат – 20,0 мг.

*Вспомогательными веществами* являются глицерин, эмульгатор №1, парафин мягкий, белый, стеариновая кислота, подсолнечное масло рафинированное, метилпарагидроксибензоат Е 218, пропилпарагидроксибензоат Е 216, вода очищенная.

#### Внешний вид препарата ГЕПАРИН и содержимое упаковки

ГЕПАРИН, мазь для наружного применения, представляет собой мазь белого цвета с желтоватым оттенком.

По 25 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска:** без рецепта.

#### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: