

Листок-вкладыш: информация для потребителя

Глицерин, 2,11 г, суппозитории ректальные
 Действующее вещество: глицерин (глицерол)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка:

1. Что из себя представляет препарат Глицерин суппозитории ректальные, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Глицерин суппозитории ректальные
3. Применение препарата Глицерин суппозитории ректальные
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Глицерин суппозитории ректальные
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Глицерин суппозитории ректальные, и для чего его применяют

Глицерин - слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника. Практически не всасывается при ректальном применении.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Глицерин суппозитории ректальные

Не применяйте препарат Глицерин суппозитории ректальные, если у Вас:

- аллергия (повышенная чувствительность) на компоненты препарата (перечислены в разделе 6),
- кишечная непроходимость,
- синдром раздражённого кишечника,
- аппендицит,
- желудочно-кишечное кровотечение,
- диарея,
- воспалительные заболевания прямой кишки (проктит, парапроктит),
- геморрой (фаза обострения),
- трещины заднего прохода,

- геморрагический ректоколит,
- опухоли прямой кишки,
- недиагностированная боль в животе,
- детский возраст до 7 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Глицерин суппозитории ректальные обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Не рекомендуется применять суппозитории более 7 дней.

Систематическое применение не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твёрдыми маслами.

При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

До и после применения суппозитория следует тщательно вымыть руки.

Применение у детей

Применение препарата у детей до 7 лет противопоказано.

Применение препарата у детей старше 7 лет возможно только после консультации врача и исключения заболеваний, которые могли повлиять на задержку опорожнения кишечника.

Применение лекарственного средства у детей необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Другие препараты и препарат Глицерин суппозитории ректальные

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Клинически значимые взаимодействия глицерола с другими лекарственными средствами не выявлены.

При одновременном применении других ректально вводимых лекарственных средств следует учитывать слабительный эффект препарата.

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые применяются ректально.

При необходимости использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только после консультации врача в случае, если польза для матери превышает возможный риск для плода/ребёнка.

Применение лекарственного средства в течение первого триместра беременности не рекомендовано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Данных о влиянии на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами нет.

3. Применение препарата Глицерин суппозитории ректальные

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Путь и способ введения:

Ректально.

Рекомендуемая доза:

Взрослым и детям старше 7 лет – по 1 суппозиторию (2,11 г) 1 раз в сутки.

Продолжительность применения не должна превышать 7 дней.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.

Если Вы применили препарата Глицерин суппозитории ректальные больше, чем следовало.

О случаях передозировки при применении препарата Глицерин суппозитории ректальные не сообщалось. При правильном применении передозировка маловероятна.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении данного препарата возможны следующие нежелательные реакции:

неизвестная частота (частота не может быть оценена по имеющимся данным):

- аллергические реакции,
- местные реакции в месте введения суппозитория (чувство дискомфорта, зуд, жжение),
- спазмы кишечника,
- ослабление физиологического процесса дефекации (при длительном применении).

У пациентов с обезвоживанием после применения глицерина в виде суппозитория возможно развитие тяжёлой дегидратации, приводящей к сердечно-сосудистой недостаточности и отёку лёгких. Описаны случаи развития некетотической гиперосмолярной гипергликемической комы, которая может привести к летальному исходу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а,

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <http://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Глицерин суппозитории ректальные

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

6. Содержимое упаковки и прочие сведения**Препарат Глицерин суппозитории ректальные содержит**

Действующим веществом является глицерин (глицерол).

Каждый суппозиторий содержит 2,11 г глицерина (глицерола).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат.

Внешний вид препарата Глицерин суппозитории ректальные и содержимое упаковки

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий-полиэтилен. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Претензии потребителей направлять по адресу:

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

**Листок-вкладыш пересмотрен**

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на вебсайте Союза:

<http://www.eurasiancommission.org>