

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**ГОМЕОВОКС®, Таблетки, покрытые оболочкой****Регистрационный номер****Название лекарственного средства**
ГОМЕОВОКС®**Форма выпуска**
Таблетки, покрытые оболочкой.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

от 15, 05 2017 г. № 581
 КЛС № 6 от 03, 05 2017 г.

Описание

Блестящие белые цилиндрические двояковыпуклые покрытые оболочкой таблетки, без запаха.

Состав

В таблетке, покрытой оболочкой:

Активные вещества:

Борец клобучковый (Aconitum napellus) 3 CH.....	0.091 мг
Аризема трехлистная (Arum triphyllum) 3 CH.....	0.091 мг
Фосфорнокислое железо (Ferrum phosphoricum) 6 CH	0.091 мг
Календула аптечная (Calendula officinalis) 6 CH.....	0.091 мг
Жженая губка (Spongia tosta) 6 CH	0.091 мг
Белладонна (Belladonna) 6 CH.....	0.091 мг
Меркурий солюбилис (Mercurius solubilis) 6 CH	0.091 мг
Сернистый кальций (Hepar sulfur) 6 CH.....	0.091 мг
Двухромовокислый калий (Kalium bichromicum) 6 CH.....	0.091 мг
Осина (Populus candicans) 6 CH.....	0.091 мг
Переступень (Bryonia) 3 CH.....	0.091 мг

Вспомогательные вещества:

сахароза, лактоза моногидрат, кукурузный крахмал, магния стеарат, акация, желатин, тальк, белый воск, воск карнаuba.

Фармакотерапевтическая группа

V03AX: Прочие лекарственные средства. Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется в комплексной терапии при симптомах ларингита, таких как усталость голосовых связок, охриплость голоса, потеря голоса.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам или любому из вспомогательных веществ.

Гомеопатическое лекарственное средство не применяется у детей до 6 лет.

Редкая врожденная непереносимость фруктозы, галактозы, недостаточность лактазы Лаппа, сахаразы и изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Меры предосторожности

Это лекарственное средство содержит сахарозу и лактозу.

Если врачи обнаружили у Вас непереносимость некоторых видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого лекарственного средства.

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Так как в состав входит Непар sulfur C6, при отите и синусите Гомеовокс может применяться только по назначению врача.

Содержание углеводов в одной таблетке соответствует около 0,03 хлебной единице.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Просьба сообщить врачу или фармацевту, если вы принимаете в настоящее время или недавно принимали любые лекарственные средства, даже отпускаемые не по рецепту, поскольку лекарственные средства могут изменять эффекты друг друга.

Беременность и лактация

В отсутствие экспериментальных и клинических данных, и в качестве меры безопасности, не рекомендуется использовать это лекарственное средство во время беременности и лактации.

Влияние на управление транспортными средствами или потенциально опасными механизмами

Не влияет.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Дозировка и способ применения

Внутрь.

Взрослые и дети в возрасте от 6 лет:

В профилактических целях: по 2 таблетки 5 раз в день.

Лечение: по 2 таблетки приблизительно каждый час.

По мере улучшения состояния увеличить интервал между приемами лекарственного средства.

Медленно рассасывайте таблетки во рту между приемами пищи.

Продолжительность лечения – не более 6 дней. Однако, при сохранении симптомов или ухудшении состояния спустя 2 дня приема лекарственного средства, следует обратиться к врачу. Также необходимо обратиться к врачу при ухудшении состояния в любой другой период приема данного лекарственного средства.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Побочное действие

На настоящее время информация о побочном действии отсутствует. Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе, не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Условия хранения и срок годности

Срок годности: 5 лет.

Лекарственное средство не нуждается в особых условиях хранения.

Хранить лекарственное средство в недоступном для детей месте.

Не используйте лекарственное средство после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

Блистеры ПВХ/Ал с 20 таблетками, покрытыми оболочкой, 3 блистера в картонной коробке.

Информация о производителе (заявителе)

БУАРОН

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

Франция

